



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 482 349 A2**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(71) Anmeldenummer: 91115834.3

(72) Anmeldetag: 18.09.91

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **C07D 231/14**, C07D 231/16,  
C07D 231/56, C07D 233/90,  
C07D 263/34, C07D 277/34,  
C07D 307/68, C07D 333/38,  
C07D 409/12, A01N 43/50,  
A01N 43/76

(30) Priorität: 20.09.90 DE 4029753

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
29.04.92 Patentblatt 92/18

(64) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
Carl-Bosch-Strasse 38  
W-6700 Ludwigshafen(DE)

(72) Erfinder: **Helstracher, Elisabeth, Dr.**  
Lenbachstrasse 10  
W-6700 Ludwigshafen(DE)  
Erfinder: **Fischer, Klaus, Dr.**  
Gabelsbergerstrasse 7  
W-6720 Speyer(DE)  
Erfinder: **Mayer, Horst, Dr.**  
Faselwiese 19  
W-6700 Ludwigshafen(DE)  
Erfinder: **Saupe, Thomas, Dr.**

Kressenwiesenweg 13  
W-6902 Sandhausen(DE)  
Erfinder: **Hamprecht, Gerhard, Dr.**  
Rote-Turm-Strasse 28  
W-6940 Weinheim(DE)  
Erfinder: **Ditrich, Klaus, Dr.**  
Paray-le-Monial-Strasse 12  
W-6702 Bad Duerkheim(DE)  
Erfinder: **Kuekenhoehner, Thomas, Dr.**  
Forststrasse 104  
W-6737 Boehl-Ingelheim(DE)  
Erfinder: **Gerber, Matthias, Dr.**  
Ritterstrasse 3  
W-6704 Mutterstadt(DE)  
Erfinder: **Walter, Helmut, Dr.**  
Gruenstadter Strasse 82  
W-6719 Obrigheim(DE)  
Erfinder: **Westphalen, Karl-Otto, Dr.**  
Mausbergweg 58  
W-6720 Speyer(DE)

(64) Sulfonamide.

(57) Sulfonamide der Formel I



I,

in der die Substituenten folgende Bedeutung haben:


- A ein gegebenenfalls substituierter aromatischer oder heteroaromatischer Rest;  
W Sauerstoff oder Schwefel;  
B ein gegebenenfalls substituierter Furyl-, Thienyl-, Pyrrolyl-, Oxazolyl-, Isothiazolyl-, Imidazolyl-,

EP 0 482 349 A2

## EP 0 482 349 A2

Pyrazolyl-, Thiadiazolyl-, Oxadiazolyl- oder Triazolylrest  
sowie deren umweltverträglichen Salze;  
Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre herbizide Verwendung.

Die vorliegende Erfindung betrifft Sulfonamide der allgemeinen Formel I



in der die Substituenten folgende Bedeutung haben:

10 A



(A1)



(A2)



(A3)



(A4)



(A5)



(A6)



(A7)



(A8)



(A9)



(A10)

W

Sauerstoff, Schwefel;

B

40 2-, 3-, 4- oder 5-Furyl, 2-, 3-, 4- oder 5-Thienyl, jeweils substituiert durch drei Reste R<sup>8</sup>;

2-, 3-, 4- oder 5-Pyrrolyl, wobei diese Reste drei C-gebundene Reste R<sup>8</sup> und einen N-gebundenen Rest R<sup>9</sup> tragen;

2-, 4- oder 5-Oxazolyl, 3-, 4- oder 5-Isioxazolyl, 2-, 4- oder 5-Thiazolyl, 3-, 4- oder 5-Isotiazolyl, jeweils substituiert durch zwei Reste R<sup>8</sup>;

45 2-, 4- oder 5-Imidazolyl, 3-, 4- oder 5-Pyrazolyl, wobei diese genannten Reste zwei C-gebundene Reste R<sup>8</sup> und einen N-gebundenen Rest R<sup>9</sup> tragen;

1,3,4-Thiadiazol-2-yl, -5-yl, 1,3,4-Oxadiazol-2-yl, -5-yl,

1,2,4-Thiadiazol-3-yl, -5-yl, 1,2,4-Oxadiazol-3-yl, -5-yl,

1,2,3-Thiadiazol-4-yl, -5-yl, 1,2,3-Oxadiazol-4-yl, -5-yl,

50 1,2,5-Thiadiazol-3-yl, -4-yl, 1,2,5-Oxadiazol-3-yl, -4-yl,

wobei diese Reste einen Rest R<sup>8</sup> tragen;

1,2,4-Triazol-3-yl, substituiert durch einen C-gebundenen Rest R<sup>10</sup> und einen N-1 gebundenen Rest R<sup>11</sup>;

1,2,4-Triazol-5-yl, 1,2,3-Triazol-4-yl, -5-yl, jeweils substituiert durch einen C-gebundenen Rest R<sup>8</sup> und einen N-1 gebundenen Rest R<sup>9</sup>;

55 X

Sauerstoff, Schwefel, NR<sup>1</sup>;

R<sup>1</sup>

Wasserstoff;

- C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, gegebenenfalls substituiert durch ein bis fünf Halogenatome und/oder Phenyl;  
 C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl;  
 Phenyl, das gegebenenfalls ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Substituenten tragen kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Nitro, Cyano;  
 5 R<sup>2</sup>  
 Halogen;  
 Cyano; Thiocyano;  
 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, welches durch ein bis fünf Halogenatome und/oder einen der folgenden Reste substituiert sein kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy oder Phenylthio, wobei die Phenylreste jeweils durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;  
 10 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkylthio, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenylalkoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenylthio, wobei diese cyclischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;  
 15 Phenyl, Phenoxy, Benzoyloxy oder Benzylthio, wobei die aromatischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;  
 20 gesättigter, einfacher oder zweifach ungesättigter 5-7-gliedriger Heterocyclus, enthaltend ein bis zwei Stickstoff-, Sauerstoff- und/oder Schwefelatome, welcher gegebenenfalls bis zu zwei der folgenden Substituenten tragen kann: Halogen, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;  
 25 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio,  
 C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenylalkoxy oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenylthio,  
 C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylalkoxy oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylthio,  
 wobei die genannten Alkoxy-, Alkylthio-, Alkenyl-, Alkenylalkoxy(thio)-, Alkylalkoxy(thio)reste durch ein bis fünf Halogenatome und/oder eine der folgenden Gruppen substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio, Benzoyloxy, Benzylthio;  
 30 COR<sup>12</sup>; COQR<sup>13</sup>; SO<sub>2</sub>NR<sup>15</sup>R<sup>16</sup>; SO<sub>2</sub>OR<sup>17</sup>; OSO<sub>2</sub>R<sup>18</sup>; S(O)<sub>n</sub>R<sup>19</sup>;  
 R<sup>3</sup>  
 einen der Reste R<sup>2</sup>; COQR<sup>3</sup>; SO<sub>2</sub>NR<sup>15</sup>R<sup>16</sup>; SO<sub>2</sub>OR<sup>17</sup>; OSO<sub>2</sub>R<sup>18</sup>; S(O)<sub>n</sub>R<sup>19</sup>;  
 35 R<sup>4</sup>  
 Wasserstoff; Halogen; Cyano;  
 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl substituiert durch ein bis fünf Halogenatome; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;  
 R<sup>5</sup>  
 40 Wasserstoff; Nitro oder einen der Reste R<sup>2</sup>;  
 R<sup>6</sup>  
 Wasserstoff; Halogen; Cyano;  
 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl substituiert durch ein bis fünf Halogenatome und/oder einen der folgenden Reste: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, OH, SH, Cyano;  
 45 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, wobei die genannten Alkoxy(thio)- bzw. Halogenalkoxy(thio)reste durch folgende Gruppen substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;  
 R<sup>7</sup>  
 Nitro; oder einen der Reste R<sup>2</sup>;  
 50 R<sup>8</sup>  
 Wasserstoff; Nitro; einen der Reste R<sup>2</sup>, oder zwei vicinale Reste R<sup>2</sup> bilden gemeinsam eine C<sub>3</sub>-Kette oder eine C<sub>4</sub>-Kette, in der eine Methyleinheit durch einen Sauerstoff oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyliminoeinheit ersetzt sein kann;  
 R<sup>9</sup>  
 55 Wasserstoff; C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, welches durch ein bis fünf Halogenatome und/oder einen der folgenden Reste substituiert sein kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio-, wobei diese cyclischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy,

- C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;  
 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl, wobei diese cyclischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;
- 5 Phenyl, wobei dieser Rest durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein kann: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;  
 C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkynyl, wobei die genannten Reste durch ein bis gegebenenfalls fünf Halogenatome und/oder eine der folgenden Gruppen substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio, Benzyloxy, Benzylthio;
- 10 COR<sup>21</sup>;  
 R<sup>10</sup>  
 Phenyl, Benzyl, Phenoxy, Benzyloxy, Phenylthio, Benzylthio, wobei die genannten Reste durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Gruppen substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;
- 15 R<sup>11</sup>  
 Wasserstoff; Phenyl, Benzyl, wobei die genannten aromatischen Reste durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Gruppen substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;
- 20 R<sup>12</sup>  
 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, unsubstituiert oder substituiert durch Halogen oder Methoxy;  
 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, unsubstituiert oder substituiert durch Chlor oder Fluor;  
 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl;  
 Q  
 25 Sauerstoff oder NR<sup>14</sup>;  
 R<sup>13</sup>  
 Wasserstoff;  
 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, substituiert durch ein bis drei der folgenden Reste: Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-alkoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl und/oder Phenyl;
- 30 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, substituiert durch ein bis drei C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylgruppen;  
 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl; C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkynyl;  
 Phenyl; Phenyl substituiert durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Gruppen: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;
- 35 R<sup>14</sup>  
 OR<sup>20</sup>; ein Rest R<sup>13</sup> oder gemeinsam mit einem weiteren Rest R<sup>13</sup> eine C<sub>4</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylkette, in der eine Methyleinheit durch einen Sauerstoff oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyliminogruppe ersetzt sein kann;  
 R<sup>15</sup>  
 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkynyl; Cyclopropylmethyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Cycloalkyl;
- 40 R<sup>16</sup>  
 Wasserstoff; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl; oder gemeinsam mit R<sup>15</sup> eine C<sub>4</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylkette, in der eine Methylengruppe durch einen Sauerstoff ersetzt sein kann;  
 R<sup>17</sup>  
 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl;
- 45 R<sup>18</sup>  
 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; N,N-Dimethylamino;  
 R<sup>19</sup>  
 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl; C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxyalkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl;  
 C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkynyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkenyl; Phenyl; Phenyl, substituiert durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl oder
- 50 Methoxy;  
 n,  
 1 oder 2;  
 R<sup>20</sup>  
 Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl;
- 55 R<sup>21</sup>  
 ein Rest R<sup>12</sup>; Phenyl, Benzyl, wobei diese aromatischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder

ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: Cyano, Nitro,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_4$ -Halogenalkyl,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy,  $C_1$ - $C_4$ -Halogenalkoxy,  $C_1$ - $C_4$ -Alkylthio,  $C_1$ - $C_4$ -Halogenalkylthio; sowie deren umweltverträglichen Salze.

- Weiterhin betrifft die Erfindung Verfahren zur Herstellung der neuen Sulfonamide sowie herbizide und bioregulatorisch wirksame Mittel, enthaltend die Verbindungen I und deren Verwendung zur Bekämpfung unerwünschten Pflanzenwachstums.

Es ist bekannt, daß bestimmte sulfonylierte 1-Carbamoyl-2-pyrazoline herbizide und/oder wachstumsregulatorische Eigenschaften besitzen (EP-A-269 141). Desweiteren zeigen einige sulfonylierte bi- oder tricyclische Carbonsäureamide herbizide und wachstumsregulatorische Aktivitäten (EP-A-244 168).

- Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, Sulfonamide mit guten herbiziden und/oder bioregulatorisch wirksamen Eigenschaften zu finden.

- Entsprechend dieser Aufgabe wurden die eingangs definierten Sulfonamide I und Verfahren zu deren Herstellung gefunden. Weiterhin betrifft die Erfindung Herbizide und Mittel zur Bekämpfung des Pflanzenwachstums, die die neuen Verbindungen I enthalten, sowie ein Verfahren zur Beeinflussung und Bekämpfung von Pflanzenwuchs mit diesen Verbindungen.

Die Verbindungen der Formel I können ein oder mehrere Chiralitätszentren enthalten und liegen dann als Diastereomergemische vor. Die Erfindung umfaßt sowohl die reinen Enantiomeren oder Diastereomeren als auch deren Gemische.

- Die Verbindungen der Formel I können Salze bilden, bei denen der Wasserstoff der  $-SO_2-NH$ -Gruppe durch ein, für die Landwirtschaft, geeignetes Kation ersetzt wird. Diese Salze sind im allgemeinen Metall-, insbesondere Alkali-, Erdalkali-, gegebenenfalls alkylierte Ammonium- oder organische Amminsalze. Sie werden vorzugsweise in inerten Lösungsmitteln, wie z.B. Wasser, Methanol oder Aceton bei Temperaturen von 0-100°C hergestellt. Geeignete Basen zur Herstellung der erfindungsgemäßen Salze sind beispielsweise Alkalicarbonat, wie Kaliumcarbonat, Alkali- und Erdalkalihydroxide, Alkali- und Erdalkalialkoholate, Ammoniak oder Ethanolamin.

In den oben genannten Definitionen bedeutet der Ausdruck "Alkyl" jeweils geradkettiges oder verzweigtes Alkyl.

Ebenso bedeuten "Alkenyl" bzw. "Alkynyl" gerad- oder verzweigtkettiges Alkenyl bzw. Alkynyl.

Der Ausdruck "Halogen" bedeutet Fluor, Chlor, Brom oder Jod.

- Bevorzugt von den Verbindungen der allgemeinen Formel I sind solche, worin

A  
ein Rest der Formel (A1), (A2), (A7), (A8), (A9)

W  
Sauerstoff

- X  
Schwefel

B  
2-, 4- oder 5-Oxazolyl, 3-, 4- oder 5-Isoxazolyl, 2-, 4- oder 5-Thiazolyl, 3-, 4- oder 5-Isiothiazolyl, wobei diese genannten Reste zwei Reste  $R^8$  tragen;

- 2-, 4- oder 5-Imidazolyl, 3-, 4- oder 5-Pyrazolyl, wobei diese genannten Reste zwei C-gebundene Reste  $R^8$  und einen N-gebundenen Rest  $R^9$  tragen;

$R^8$   
Wasserstoff bedeutet, sowie deren umweltverträgliche Salze.

Besonders bevorzugt von den Verbindungen der allgemeinen Formel I sind solche, worin


- A  
einen Rest der Formel (A1)

B  
3-, 4- oder 5-Pyrazolyl, wobei diese genannten Reste zwei C-gebundene Reste  $R^8$  und einen N-gebundenen Rest  $R^9$  tragen; bedeutet, sowie deren umweltverträglichen Salze.

- Die Verbindungen der Formel I sind auf vielfältige Weise analog zu bekannten Umsetzungsmethoden erhältlich. Exemplarisch seien sieben Verfahren (A bis G) im folgenden erläutert.

Verfahren A

- Man erhält Verbindungen der Formel I mit  $W=O$ , in an sich bekannter Art und Weise (M.L. Crossley, E.H. Northey, M.E. Hultquist, J. Am. Chem. Soc. 61, 2950-2955, (1939)) durch Umsetzung eines entsprechenden Sulfonamids II in einem inerten organischen Lösungsmittel in Gegenwart einer Base mit einem Säurehalogenid der Formel III gemäß dem nachfolgenden Schema:



Hal in Formel III bedeutet dabei Chlor oder Brom.

Zweckmäßigerweise verwendet man für diese Umsetzungen Lösungsmittel, wie Halogenkohlenwasserstoffe, z.B. Tetrachlormethan, Chloroform, Methylenchlorid, Dichlorethan, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol; Ether z.B. Diethylether, Methyl-tert.-butylether, Dimethoxyethan, Diethylen glykoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan; Ketone z.B. Aceton, Ethylmethylketon, Cyclohexanon; dipolare aprotische Lösungsmittel z.B. Acetonitril, N-Methylpyrrolidon; Aromaten z.B. Benzol, Toluol, Xylol, Pyridin, Chinolin oder entsprechende Gemische.

Die Umsetzung kann bei Temperaturen von 0°C bis zur Rückflußtemperatur des jeweiligen Lösungsmittels bzw. -gemisches durchgeführt werden.

Als Basen dienen dabei aromatische Stickstoffbasen, wie Pyridin, 4-Dimethylaminopyridin, Chinolin; tertiäre aliphatische Amine, wie Triethylamin, N-Ethyl-N,N-diisopropylamin und N-Methylmorpholin; bi- und tricyclische Amine, wie z.B. Diazabicycloundecen (DBU) oder Diazabicyclooctan (DABCO) sowie Hydroxide, Hydride, Alkoxide, Carbonate und Hydrogencarbonate von Alkalimetall- und Erdalkalimetallkationen, insbesondere Natriumhydrid, Kaliumhydrid, Natriumhydrid, Calciumhydrid, Lithiumhydrid, Natriummethanolat, Natriumethanolat, Kalium-tert.-butylat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat. Mitunter ist es auch nützlich, Kombinationen der oben angeführten Basen zu verwenden.

Üblicherweise setzt man die Ausgangsstoffe II und III im stöchiometrischen Verhältnis ein, jedoch kann ein Überschuß der einen oder anderen Komponente vorteilhaft sein.


Das molare Verhältnis von Sulfonamid II zu Base beträgt im allgemeinen 1:1 bis 1:3.

Die Konzentration der Edukte im Lösungsmittel beträgt im allgemeinen 0,1 bis 5,0 mol/l, bevorzugt 0,2 bis 2,0 mol/l.

Besonders bevorzugt verwendet man inerte aprotische Solventien wie Methylenchlorid, Aceton, Toluol unter Verwendung von Natriumhydrid, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat als Basen.

#### Verfahren B

Man erhält Verbindungen der Formel I, mit W=O, in an sich bekannter Weise (J.T. Drummond, G. Johnson, Tetrahedron Lett. 29, 1653-1656 (1988)) durch Umsetzung einer Verbindung der Formel IV in Gegenwart von aktivierenden Reagentien, wie 2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid, Dicyclohexylcarbodiimid oder 1,1-Carbonyldiimidazol, und gegebenenfalls in Gegenwart einer Base, mit einer Verbindung der Formel II.



Zweckmäßigerweise wird die "aktivierte" Carbonsäure direkt ohne Zwischenisolierung gegebenenfalls in Gegenwart einer Base mit der Komponente II umgesetzt.

Die Reaktionen werden zweckmäßigerweise in Lösungsmitteln, wie Halogenkohlenwasserstoffe z.B. Chloroform, Methylenchlorid, Dichlorethan, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol; Ether, z.B. Diethylether, Methyl-tert.-butylether, Dimethoxyethan, Diethylen glykoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan; dipolaren aprotischen Lösungsmitteln z.B. Acetonitril; Aromaten, z.B. Benzol, Toluol, Xylol oder entsprechenden Gemischen durchgeführt.

Die Umsetzungen können bei Temperaturen von -30°C bis zur Rückflußtemperatur des jeweiligen Lösungsmittels bzw. -gemisches durchgeführt werden.


Als Basen werden beispielsweise organische Stickstoffbasen, wie Pyridin, 4-Dimethylaminopyridin, Chinolin, Triethylamin, N-Ethyl-N,N-diisopropylamin, Diazabicycloundecen (DBU) etc. sowie Hydroxide, Hydride, Alkoxide, Carbonate und Hydrogencarbonate von Alkali- und Erdalkalimetallkationen, insbesondere

Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhydrid, Kaliumhydrid, Calciumhydrid, Natriummethanolat, Natriumethanolat, Kalium-tert.-butylat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat verwendet. Mitunter ist es von Vorteil Kombinationen der oben aufgeführten Basen zu verwenden.

- 5 Üblicherweise werden die Ausgangsstoffe II und IV, sowie das Aktivierungsreagenz im stöchiometrischen Verhältnis eingesetzt, jedoch kann ein Überschuß der einen oder anderen Komponente von Vorteil sein.

#### Verfahren C

- 10 Verbindungen der Formel I, mit  $W=O$ , können in an sich bekannter Weise M. Seefelder, Chem. Ber. 96, 3243-3253 (1963) durch Umsetzung einer Verbindung der Formel V mit einer Verbindung der Formel VI erhalten werden.




- 20 M in Formel VI bedeutet dabei Wasserstoff oder Lithium.  
Zweckmäßigerweise werden inerte Lösungsmittel wie Halogenkohlenwasserstoffe, z.B. Chloroform, Methylchlorid, Dichlorethan, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol; Ether z.B. Tetrahydrofuran, Dioxan, Dimethoxyethan, Diethylenglycoldimethylether; Aromaten z.B. Benzol, Toluol, Xylol, Nitrobenzol oder entsprechende Gemische verwendet.

- 25 Die Umsetzungen können bei Temperaturen von  $-78^\circ\text{C}$  bis zur Rückflußtemperatur des jeweiligen Lösungsmittels bzw. -gemisches durchgeführt werden.

- Üblicherweise werden die Edukte V und VI im stöchiometrischen Verhältnis eingesetzt, jedoch kann in Einzelfällen ein Überschuß der einen oder anderen Komponente vorteilhaft sein.

#### 30 Verfahren D

- Man erhält Verbindungen der Formel I, mit  $W=O$ , in an sich bekannter Weise (GB 2092 136) durch Umsetzung einer Verbindung der Formel VII mit einer Verbindung der Formel VIII in Gegenwart einer starken Base.



- 45 Zweckmäßigerweise werden polare, aprotische Lösungsmittel, z.B. Acetonitril, Nitromethan, Nitroethan, Nitrobenzol, Pyridin, Benzonitril, N,N-Dimethylformamid, N,N-Diethylformamid, N,N-Dimethylacetamid, Dimethylsulfoxid, N-Methylpyrrolidon, Dioxan, Tetrahydrofuran, Dimethoxyethan, Diethylenglycoldimethylether oder entsprechende Gemische verwendet.

- Die Umsetzungen werden gewöhnlich in einem Temperaturbereich von  $-20^\circ\text{C}$  bis Rückflußtemperatur des jeweiligen Lösungsmittels bzw. -gemisches durchgeführt.


- 50 Als Basen werden üblicherweise anorganische Basen, wie Oxide, Hydroxide, Hydride, Carbonate und Hydrogencarbonate sowie Alkalimetallalkoxide eingesetzt, insbesondere Natriumoxid, Lithiumoxid, Kaliumoxid, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhydrid, Kaliumhydrid, Calciumhydrid, Natriummethanolat, Natriumethanolat, Kaliumtert.-butylat, Soda, Pottasche, Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat. Mitunter kann es von Vorteil sein, Kombinationen der oben angeführten Basen zu verwenden.

- 55 In der Regel werden die Ausgangsstoffe VII und VIII, sowie die Base im stöchiometrischen Verhältnis eingesetzt, jedoch kann ein Über- oder Unterschluß der einen oder anderen Komponente von Vorteil sein.



## Verfahren E

Man erhält Verbindungen der Formel I mit  $W=O$ , in an sich bekannter Art und Weise (M.M. Kremlev, V.G. Dolyuk, J. Org. Chem. (USSR) 10, 671-672 (1974)) durch Umsetzung einer Verbindung der Formel IX  
 5 und einer Verbindung der Formel X mit einer Verbindung der Formel XI,




wobei T ein Alkalimetall und Hal Chlor oder Brom bedeutet.

Zweckmäßigerweise werden inerte Lösungsmittel wie Halogenkohlenwasserstoffe, z.B. Chloroform, 15 Methylchlorid, Dichlorethan, Tetrachlorkohlenstoff, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol; Aromaten, z.B. Benzol, Toluol, Xylol, Nitrobenzol oder entsprechende Gemische verwendet. Die Umsetzungen können bei Temperaturen von 0°C bis zur Rückflußtemperatur des jeweiligen Lösungsmittels bzw. -gemisches durchgeführt werden.

Üblicherweise werden die Edukte im stöchiometrischen Verhältnis eingesetzt, jedoch kann in Einzelfällen ein Überschuß der einen oder anderen Komponente von Vorteil sein.

## Verfahren F

Man erhält Verbindungen der Formel I mit  $W=S$  in Analogie zu literaturbekannten Verfahren (S. Scheibye, B.S. Pederson, S.O. Lawesson, Bull. Soc. Chim. Belg. 87, 229-238 (1978)) durch Umsetzung einer nach Verfahren A bis E erhaltenen Verbindung der Formel I mit der Verbindung der Formel XII in einem inerten aprotischen




Lösungsmittel, wie z.B. Benzol, Toluol, Xylol, HMPA, Dimethoxyethan, Diethylenglykoldimethylether bzw. entsprechenden Gemischen.

Die Umsetzung kann im Temperaturbereich von etwa 0°C bis Rückflußtemperatur des jeweiligen Lösungsmittels bzw. -gemisches durchgeführt werden.

Üblicherweise setzt man die Ausgangsstoffe I ( $W=O$ ) und XII im stöchiometrischen Verhältnis ein, jedoch kann ein Überschuß der einen oder anderen Komponente von Vorteil sein.

## Verfahren G

Man erhält Verbindungen der Formel I nach literaturbekannten bzw. in Analogie zu literaturbekannten Verfahren (T.L. Gilchrist, "Heterocyclic Chemistry", Pitman Publisher, London (1985)) durch Umsetzung einer nach Verfahren A bis E erhaltenen Verbindung der Formel XIII, die dadurch gekennzeichnet ist, daß der Heterocyclus B' einen C-gebundenen Substituenten, der als Abgangsgruppe fungiert, trägt, mit einem Nucleophil.



Hierbei wird die Abgangsgruppe, wie z.B. Phenolat, Chlorid, Bromid, Nitro etc. durch die "Nucleophileneinheit" ersetzt.

Als Nucleophile können unter anderem Alkoholate, Thiolate, Hydride, Alkalimetallalkyle verwendet werden.

- 5 Zweckmäßigerweise werden in Anpassung an das jeweilige Nucleophil polare aprotische Lösungsmittel wie Dimethylsulfoxid (DMSO), Dimethylformamid (DMF), polare Lösungsmittel wie Alkohole, Wasser etc., inerte Lösungsmittel wie Diethylether, Methyl-tert.-butylether, Tetrahydrofuran (THF), Dioxan, Dimethoxyethan, Diethylenglykoldimethylether oder entsprechende Gemische verwendet.

- Die Umsetzungen werden gewöhnlich in einem Temperaturbereich von -78°C bis Rückflußtemperatur des jeweiligen Lösungsmittels bzw. -gemisches durchgeführt.

- 10 In der Regel werden die Ausgangsstoffe im stöchiometrischen Verhältnis eingesetzt, jedoch kann ein Über- oder Unterschuß der einen oder anderen Komponente von Vorteil sein.

- Die bei Verfahren A und B eingesetzten Sulfonamide der Formel II sind in vielen Fällen handelsüblich. Neue Sulfonamide der Formel II lassen sich nach allgemein bekannten Methoden darstellen (S. Pawlenko, in "Methoden der organischen Chemie", Houben-Weyl, Bd. E 11/II, S. 1098 ff., 4. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 1985).

- 15 Die im Verfahren A verwendeten Säurehalogenide der Formel III lassen sich in bekannter Weise (M.F. Ansell, in "The Chemistry of acyl halides" (ed. S. Patai), S. 35ff., 1. Auflage, Interscience Publishers, London (1972)) aus den entsprechenden Carbonsäuren (IV)

20



(IV)

25

oder deren Salzen mit organischen Säurehalogeniden, wie z.B. Oxalylchlorid, Phosgen, Benzoylchlorid oder mit anorganischen Säurehalogeniden, wie z.B. POHal<sub>3</sub>, PHal<sub>3</sub>, SOCl<sub>2</sub>, P(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>Hal<sub>2</sub> etc. oder binären Systemen wie z.B. P(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>/CCl<sub>4</sub> usw. darstellen.

- 30 In manchen Fällen kann der Zusatz einer geeigneten Base, insbesondere organische Stickstoffbasen, wie z.B. Pyridin, 2,6-Lutidin oder Triethylamin oder eines geeigneten Katalysators, wie z.B. Dimethylformamid oder 4-Dimethylaminopyridin zweckmäßig sein.

- Die Carbonsäuren der Formel IV sind literaturbekannt oder können in Analogie zu literaturbekannten Methoden hergestellt werden (R. Sustmann, H.-G. Korth, in "Methoden der organischen Chemie", Houben-Weyl, Bd. E5/I, S. 193 ff., 4. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 1985).

- 35 Die Herstellung der Sulfonylisocyanate der Formel V erfolgt nach für den Fachmann bekannten Standardverfahren ("Newer Methods of Preparative Organic Chemistry", Bd. VI, S. 223 ff., Academic Press, New York).

- Die bei Verfahren C benötigten Verbindungen der Formel VI können ebenfalls nach Standardverfahren dargestellt werden.

- Die bei Verfahren D eingesetzten Sulfochloride der Formel VII sind in vielen Fällen handelsüblich. Neue Sulfochloride der Formel VII lassen sich nach für den Fachmann bekannten Verfahren darstellen (S. Pawlenko, in "Methoden der organischen Chemie", Houben-Weyl, Bd. E 11/II, S. 1067 ff., 4. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 1985).

- 45 Verbindungen der Formel VIII sind literaturbekannt oder können nach bekannten Methoden hergestellt werden (D. Döpp, H. Döpp, in "Methoden der organischen Chemie", Houben-Weyl, Bd. E5/II, S. 934 ff., 4. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 1985).

- Die Darstellung der Salze der Formel IX erfolgt nach bekannten Standardverfahren (F. Muth, in "Methoden der organischen Chemie", Houben-Weyl, Bd. 9, S. 629 ff., 4. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 1955).

- 50 Ebenso sind die Sulfonsäurehalogenamide der Formel X literaturbekannt oder können auf an sich bekannter Art und Weise dargestellt werden (F. Muth, in "Methoden der organischen Chemie", Houben-Weyl, Bd. 9, S. 641 ff., 4. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 1955).

- Die Aldehyde der Formel XI können nach bekannten Verfahren synthetisiert werden (O. Bayer, in "Methoden der organischen Chemie" (Houben-Weyl) Bd. 7/1, 4. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 1954; Bd. E3, 4. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 1983).

55

Im Hinblick auf die bestimmungsgemäße Verwendung sind Verbindungen der Formel I bevorzugt, in denen die Substituenten folgende Bedeutung haben:

X

Sauerstoff, Schwefel, NR<sup>1</sup>,

5 R<sup>1</sup>

Wasserstoff;

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, insbesondere C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl und 1,1-Dimethylethyl, gegebenenfalls substituiert durch 1 bis 5, insbesondere 1 bis 3 Halogenatome wie Fluor, Chlor oder Brom und/oder durch Phenyl,

10 C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl, wie Ethenyl, 1-Propenyl, 2-Propenyl, 1-Methylethenyl, 1-Butenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-1-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 2-Methyl-1-propenyl, Phenyl, Phenyl substituiert durch 1 bis 5 Halogenatome wie Fluor, Chlor oder Brom und/oder ein bis drei der eingangs genannten Substituenten.

R<sup>2</sup>

15 Halogen wie Fluor, Chlor, Brom oder Iod, insbesondere Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Thiocycano;

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl, 1,1-Dimethylethyl, Pentyl, 1-Methylbutyl, 2-Methylbutyl, 3-Methylbutyl, 2,2-Dimethylpropyl, 1-Ethylpropyl, Hexyl, 1,1-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 1-Methylpentyl, 2-Methylpentyl, 3-Methylpentyl, 4-Methylpentyl, 1,1-Dimethylbutyl, 1,2-Dimethylbutyl, 1,3-Dimethylbutyl, 2,2-Dimethylbutyl, 2,3-Dimethylbutyl, 3,3-Dimethylbutyl, 2-Ethylbutyl, 1,1,2-Trimethylpropyl, 1,2,2-Trimethylpropyl, 1-Ethyl-1-methylpropyl und 1-Ethyl-2-methylpropyl, welches durch 1 bis 5 Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor oder Brom substituiert ist und/oder einen der folgenden Substituenten tragen kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy, 1-Methylethoxy, Butoxy, 1-Methylpropoxy, 2-Methylpropoxy, 1,1-Dimethylethoxy bzw. die entsprechenden Alkylthioester, wobei diese Reste durch Halogen, insbesondere Fluor, Chlor, Brom substituiert sein können, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio, gegebenenfalls substituiert durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor, Brom und/oder ein bis drei C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl- oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxyreste;

20 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl und C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkylthio wie Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, insbesondere Cyclopropyl, Cyclopentyl und Cyclohexyl, welches ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor und Brom, und/oder ein bis drei der folgenden Reste tragen kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, insbesondere Methyl, sowie die entsprechenden über Schwefel gebundenen Cycloalkylthioester;

25 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkoxy wie Cyclopropoxy, Cyclobutoxy, Cyclopentoxy, Cyclohexoxy, Cycloheptoxy, Cyclooctoxy, insbesondere Cyclopropoxy, Cyclopentoxy und Cycloheptoxy, welches durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor und Brom, und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein kann:

30 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, insbesondere Methyl;

35 C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl wie 1-Cyclopentenyl, 2-Cyclopentenyl, 3-Cyclopentenyl, 1-Cyclohexenyl, 2-Cyclohexenyl, 3-Cyclohexenyl, welches durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor oder Brom, und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, insbesondere Methyl;

40 C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenylthio wie 1-Cyclopentenylthio, 2-Cyclopentenylthio, 3-Cyclopentenylthio, 1-Cyclohexenylthio, 2-Cyclohexenylthio, 3-Cyclohexenylthio, welches durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor oder Brom, und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, insbesondere Methyl;

45 C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenylthio wie 1-Cyclopentenylthio, 2-Cyclopentenylthio, 3-Cyclopentenylthio, 1-Cyclohexenylthio, 2-Cyclohexenylthio, 3-Cyclohexenylthio, welches durch ein bis fünf der folgenden Reste tragen kann: Fluor, Chlor, Brom oder Iod, insbesondere Fluor, Chlor oder Brom und/oder ein bis drei der folgenden Reste: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, insbesondere Methyl;

50 Phenyl, Phenoxy, Benzylthio, Benzylthio, wobei die aromatischen Gruppen substituiert sein können durch 1 bis 5 Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor oder Brom und/oder ein bis drei der folgenden Reste: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

55 gesättigter, einfacher oder zweifach ungesättigter 5-7-gliedriger Heterocyclen, enthaltend ein bis zwei Stickstoff-, Sauerstoff- und/oder Schwefelatome, z.B. Thiophen, Furan, Isoxazol, Pyrazol, Thiazol, Oxazol, Oxadiazol, Thiadiazol, Tetrahydrofuran, Tetrahydropyran, wobei die heterocyclischen bzw. heteroaromatischen Reste 1 oder 2 der folgenden Substituenten tragen können: Halogen, wie Fluor, Chlor, Brom, Iod, insbesondere Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, welches durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor, Brom substituiert sein kann, sowie die entsprechenden

G<sub>1</sub>=G<sub>2</sub>=Alkoxy oder Alkylthio wie Methoxy, Ethoxy, Propyloxy, 1-Methyl-

5 C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio bzw. die entsprechenden Alkylthiorest;e;

10 Methyl-3-butenyl, 1,1-Dimethyl-2-propenyl, 1,2-Dimethyl-1-propenyl, 1,2-Dimethyl-2-propenyl, 1-Ethyl-1-pro-

15 Dimethyl-2-butenyl 1,1-Di-methyl-3-butenyl 1,2-Dimethyl-1-butenyl 1,2-Dimethyl-2-butenyl 1,2-Dimethyl-3-

propyl-, 1-äthyl-1-methyl-2-propenyl-, 1-äthyl-2-methyl-1-propenyl- und 1-äthyl-2-methyl-2-propenyl-, welche durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor oder Brom, und/oder durch ein

Co-C<sub>3</sub>-Alkynyl, Alkynoxy oder Alkynylthio wie Ethynyl, 1-Propynyl, 2-Propynyl, 1-Butynyl, 2-Butynyl, 3-Butynyl.

1,1-Dimethyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-3-butanol, 1,3-Dimethyl-2-butanol, 2,3-Dimethyl-2-butanol, 2,3-

Halogenalkylthio sowie die entsprechenden über Sauerstoff bzw. Schwefel gebundenen Alkinyloxy- bzw.

COOR<sup>13</sup> wie Carboxyl, wie Alkoxycarbonyl mit C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt. Cycloalkoxycarbonyl mit

Cycloalkylaminocarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl wie unter R<sup>1</sup> genannt, wie N-Alkylaminocarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie N-Alkylaminocarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie

R<sup>13</sup> genannt und Phenyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie N-Alkoxyaminocarbonyl mit Alkoxy wie unter R<sup>13</sup>

SO<sub>2</sub>NR<sup>15</sup>R<sup>16</sup> wie N-Alkylaminosulfonyl mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben, wie N-Alkenylaminosul-

55 mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>16</sup> beschrieben, wie N-Alkyl-N-alkenylaminosulfonyl mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter

1

- C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>15</sup> aufgeführt und C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Cycloalkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben, wie 1-Azacycloalkylsulfonil mit 1-Azacycloalkyl wie unter R<sup>16</sup> beschrieben, insbesondere N,N-Dimethylaminosulfonil, N,N-Diethylaminosulfonil;
- SO<sub>2</sub>OR<sup>17</sup>, wie Alkoxyalsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>17</sup> beschrieben, wie Halogenalkoxysulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl wie unter R<sup>17</sup> beschrieben, insbesondere Methoxysulfonil, Ethoxysulfonil, Isopropoxysulfonil;
- OSO<sub>2</sub>R<sup>18</sup>, wie Alkylsulfoniloxymit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>18</sup> beschrieben, wie N,N-Dimethylsulfoniloxymit, insbesondere Methylsulfoniloxymit, Ethylsulfoniloxymit;
- Si(O)<sub>2</sub>R<sup>19</sup>, wie Alkylsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Halogenalkylsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, Alkoxyalkylsulfonil mit C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxyalkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Alkenylsulfonil mit C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl wie unter R<sup>19</sup> aufgeführt, wie Alkylsulfonil mit C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkenylsulfonil mit C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkenyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Phenylsulfonil mit Phenyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Alkylsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>19</sup> aufgeführt, wie Halogenalkylsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Phenylsulfonil mit Phenyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, insbesondere Methylsulfonil, Ethylsulfonil, Isopropylsulfonil, Propylsulfonil, Methylsulfonil, Ethylsulfonil.
- R<sup>3</sup>
- einen der Reste R<sup>6</sup>, insbesondere Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Chlormethyl, Methoxymethyl, Methylthiomethyl, Methoxy, Ethoxy, Isopropoxy, Trifluormethoxy, Difluormethoxy, Chlordifluormethoxy, 2,2,2-Trifluoroethoxy, 2-Chlorethoxy, 2-Methoxyethoxy, Methylthio, Ethylthio;
- COQR<sup>13</sup>, wie Carboxyl, wie Alkoxyacarbonyl mit C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, Cycloalkoxyacarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie Alkenyloxyacarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie Alkinyloxyacarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie Phenoxycarbonyl mit Phenyl wie unter R<sup>13</sup> aufgeführt, wie Carboxamid, wie N-Alkylaminocarbonyl mit C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie N-Cycloalkylaminocarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie N-Alkenylaminocarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie N-Alkylaminocarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie N-Phenylaminocarbonyl mit Phenyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie N,N-Dialkylaminocarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> aufgeführt, wie N-Alkyl-N-Cycloalkylaminocarbonyl mit C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> aufgeführt und C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie N-Alkyl-N-Phenylaminocarbonyl mit C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl wie unter R<sup>13</sup> genannt und Phenyl wie unter R<sup>13</sup> genannt, wie N-Alkoxyaminocarbonyl mit Alkoxy wie unter R<sup>14</sup> beschrieben, wie 1-Azacycloalkylacarbonyl mit 1-Azacycloalkyl wie unter R<sup>14</sup> beschrieben, insbesondere Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, N-Methylaminocarbonyl, N,N-Dimethylaminocarbonyl;
- SO<sub>2</sub>NR<sup>15</sup>R<sup>16</sup>, wie N-Alkylaminosulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben, wie N-Alkenylaminosulfonil mit C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben, wie N-Alkylaminosulfonil mit C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben, wie N-Cyclopropylmethylaminosulfonil, wie N-Cycloalkylaminosulfonil mit C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Cycloalkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben, wie N,N-Dialkylaminosulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben und mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>16</sup> beschrieben, wie N-Alkyl-N-alkenylaminosulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben und C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl wie unter R<sup>16</sup> beschrieben, wie N-Alkyl-N-alkinylaminosulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben und C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>16</sup> aufgeführt, wie N-Alkyl-N-cyclopropylmethylaminosulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben, wie N-Alkyl-N-cycloalkylaminosulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>15</sup> aufgeführt und C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Cycloalkyl wie unter R<sup>15</sup> beschrieben, wie 1-Azacycloalkylsulfonil mit 1-Azacycloalkyl wie unter R<sup>16</sup> beschrieben, insbesondere N,N-Dimethylaminosulfonil, N,N-Diethylaminosulfonil;
- SO<sub>2</sub>OR<sup>17</sup>, wie Alkoxyalsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>17</sup> beschrieben, wie Halogenalkoxysulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl wie unter R<sup>17</sup> beschrieben, insbesondere Methoxysulfonil, Ethoxysulfonil, Isopropoxysulfonil;
- OSO<sub>2</sub>R<sup>18</sup>, wie Alkylsulfoniloxymit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>18</sup> beschrieben, wie N,N-Dimethylsulfoniloxymit, insbesondere Methylsulfoniloxymit, Ethylsulfoniloxymit;
- Si(O)<sub>2</sub>R<sup>19</sup>, wie Alkylsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Halogenalkylsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, Alkoxyalkylsulfonil mit C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxyalkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Alkenylsulfonil mit C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl wie unter R<sup>19</sup> aufgeführt, wie Alkylsulfonil mit C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkenylsulfonil mit C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkenyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Phenylsulfonil mit Phenyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Alkylsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie unter R<sup>19</sup> aufgeführt, wie Halogenalkylsulfonil mit C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, wie Phenylsulfonil mit Phenyl wie unter R<sup>19</sup> beschrieben, insbesondere Methylsulfonil, Ethylsulfonil, Isopropylsulfonil, Propylsulfonil, Methylsulfonil, Ethylsulfonil;

R<sup>4</sup>

Wasserstoff,

Halogen, insbesondere Fluor, Chlor, Brom, Cyano,

- 5 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl, 1,1-Dimethylethyl, welches durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor oder Brom, substituiert sein kann, sowie die entsprechend über Sauerstoff und Schwefel gebundenen Alkoxy bzw. Alkylthioester, insbesondere Methyl, Ethyl, Fluormethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Pentafluorethyl, Methoxy, Ethoxy, Chlormethoxy, Dichlormethoxy, Trichlormethoxy, Fluormethoxy, Difluormethoxy, Chlordifluormethoxy, Trifluormethoxy, Dichlorfluormethoxy, 2-Fluorethoxy, 2,2-Difluorethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, 2-Chlor-2-fluorethoxy, 2-Chlor-2,2-difluorethoxy, 2,2-Dichlor-2-fluorethoxy, 2,2,2-Trichlorethoxy, Pentafluorethoxy, 2-Chlorethoxy;

R<sup>5</sup>

Wasserstoff; Nitro oder einen der Reste R<sup>2</sup>, insbesondere Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy, 2-Chlorethoxy, 2-Methoxyethoxy, Trifluormethoxy, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, N,N-Dimethylaminocarbonyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, N-Isopropylaminosulfonyl, N,N-Dimethylaminosulfonyl;

R<sup>6</sup>

Wasserstoff;

Halogen, wie Fluor, Chlor, Brom, Iod, insbesondere Fluor, Chlor, Brom;

- 20 Cyano;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl und 1,1-Dimethylethyl, welches durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor oder Brom, und/oder einen der folgenden Reste substituiert sein kann: Hydroxy, Mercapto, Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Butoxy, 1-Methylethoxy, 1-Methylpropoxy, 2-Methylpropoxy, 1,1-Dimethylethoxy, welches durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor, Brom substituiert sein kann, sowie die entsprechenden über Schwefel gebundenen Alkylthioester, insbesondere Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Chlormethyl, Methoxymethyl, Methylthiomethyl;

- 25 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Butoxy, 1-Methylethoxy, 1-Methylpropoxy, 2-Methylpropoxy, 1,1-Dimethylethoxy, welches durch ein bis fünf Halogenatome, insbesondere Fluor, Chlor oder Brom und/oder durch nachfolgende Reste substituiert sein kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Butoxy, 1-Methylethoxy, 1-Methylpropoxy, 2-Methylpropoxy, 1,1-Dimethylethoxy, welches durch Halogene, insbesondere Fluor, Chlor, Brom substituiert sein kann, sowie die entsprechenden über Schwefel gebundenen Alkylthioester, insbesondere Methoxy, Ethoxy, Isopropoxy, Trifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Difluormethoxy, 2-Chlorethoxy, 2-Methoxyethoxy, Methylthio, Ethylthio;

- 35 R<sup>7</sup>

Nitro oder einen der Reste R<sup>2</sup>, insbesondere Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Chlormethyl, Fluormethyl, Difluormethyl, Chlordifluormethyl, Trifluormethyl, Dichlorfluormethyl, Methoxymethyl, Methoxycarbonyl, N,N-Dimethylaminocarbonyl, Ethoxycarbonyl;

R<sup>8</sup>

- 40 Wasserstoff, Nitro oder einen der Reste R<sup>2</sup>, insbesondere Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Nitro, Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl, 1,1-Dimethylethyl, Fluormethyl, Chlormethyl, Brommethyl, Bromdifluormethyl, Trifluormethyl, Trichlormethyl, 2-Chlorethyl, 2-Chlorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, Pentafluorethyl, Methoxymethyl, 2-Methoxyethyl, 1-Methoxyethyl, 2-Methoxy-1-methylethyl, Ethoxymethyl, Benzyl, Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Phenyl, 2-Methylphenyl, 3-Methylphenyl, 4-Methylphenyl, 2-Trifluormethylphenyl, 3-Trifluormethylphenyl, 4-Trifluormethylphenyl, 2-Fluorphenyl, 3-Fluorphenyl, 4-Fluorphenyl, 2-Chlorphenyl, 3-Chlorphenyl, 4-Chlorphenyl, 2-Nitrophenyl, 3-Nitrophenyl, 4-Nitrophenyl, 2-Methoxyphenyl, 3-Methoxyphenyl, 4-Methoxyphenyl, 2-Tetrahydropyranyl, 3-Tetrahydropyranyl, 4-Tetrahydropyranyl, 2-Tetrahydrofuran-2-yl, 2-Thienyl, 2-Furyl, 3-Furyl, 1-Methyl-3-pyrazolyl, 1-Methyl-4-pyrazolyl, 1-Methyl-5-pyrazolyl, 1-Ethyl-3-pyrazolyl, 1-Ethyl-4-pyrazolyl, 1-Ethyl-5-pyrazolyl, Methoxy, Ethoxy, Isopropoxy, 2-Chlorethoxy, 2-Methoxyethoxy, Trifluormethoxy, Difluormethoxy, Chlordifluormethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, Phenoxy, Benzoyloxy, Methylthio, Ethylthio, Phenylthio, Benzylthio, 2-Propenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl, 2-Butenyl, 2-Propinyl, 1-Methyl-2-propinyl, 2-Butinyl, Methylcarbonyl, Ethylcarbonyl, Cyclopropylcarbonyl, Chlormethylcarbonyl, Brommethylcarbonyl, Fluormethylcarbonyl, Trifluormethylcarbonyl, Methoxymethylcarbonyl, Carboxyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, 2,2,2-Trifluorethoxycarbonyl, 2-Methoxyethoxycarbonyl, Benzoyloxycarbonyl, Aminocarbonyl, N-Methylaminocarbonyl, N,N-Dimethylaminocarbonyl, N-Ethylaminocarbonyl, N,N-Diethylaminocarbonyl, N-Isopropylaminocarbonyl, N-Benzylaminocarbonyl, N-Phenylaminocarbonyl, N-Methoxyaminocarbonyl, N-Ethoxyaminocarbonyl, N,N-Dimethylaminosulfonyl, N-Methyl-N-

- ethylaminosulfonyl, N,N-Diethylaminosulfonyl, N-Methylaminosulfonyl, N-Ethylaminosulfonyl, Methoxysulfonyl, Ethoxysulfonyl, Isopropoxysulfonyl, 2-Chlorethoxysulfonyl, 2,2,2-Trifluorethoxysulfonyl, Methylsulfonyloxy, Ethylsulfonyloxy, Isopropylsulfonyloxy, N,N-Dimethylaminosulfonyloxy, Methylsulfinyl, Ethylsulfinyl, Isopropylsulfinyl, Phenylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Isopropylsulfonyl, Propylsulfonyl
- 5 oder 2 vicinale Reste  $R^2$  bilden gemeinsam eine  $C_3$ -Kette wie Propylen oder eine  $C_4$ - $C_4$ -Kette, in der eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder eine  $C_1$ - $C_4$ -Alkyliminoeinheit wie Methyl-, Ethyl-, Propyl- oder Butylimino ersetzt sein kann;  
 $R^3$   
 Wasserstoff;
- 10 gegebenenfalls substituiertes  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl, insbesondere  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl und 1,1-Dimethylethyl, wobei als Substituenten insbesondere folgende Reste in Betracht kommen: Fluor, Chlor, Brom,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy, insbesondere Methoxy, Ethoxy, Phenyl;  
 $C_3$ - $C_6$ -Cycloalkyl oder Cycloalkenyl wie Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cyclopent-1-enyl, Cyclopent-2-enyl, Cyclopent-3-enyl, Cyclohex-1-enyl, Cyclohex-2-enyl, Cyclohex-3-enyl, wobei die cyclischen Reste weiter substituiert sein können, vorzugsweise durch Methyl, Ethyl, Fluor, Chlor, Trifluormethyl;
- 15 gegebenenfalls substituiertes Phenyl;  
 $C_2$ - $C_6$ -Alkenyl oder  $C_2$ - $C_6$ -Alkyl wie unter  $R^2$  aufgeführt, insbesondere Vinyl, 2-Propenyl, 2-Propinyl;  
 $COR^{11}$ , insbesondere Methylcarbonyl, Ethylcarbonyl, Phenylcarbonyl;
- 20  $R^{10}$   
 gegebenenfalls substituiertes Phenyl, Benzyl, Phenoxy, Phenylthio, Benzylloxy, Benzylthio, wobei als Substituenten vorzugsweise Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxy, Ethoxy in Betracht kommen;
- 25  $R^{11}$   
 Wasserstoff;  
 gegebenenfalls substituiertes Phenyl oder Benzyl, z.B. 2-substituiertes oder 2,4-disubstituiertes oder 2,6-disubstituiertes oder 2,4,6-trisubstituiertes Phenyl oder Benzyl, wobei folgende Substituenten in Betracht kommen: Cyano, Nitro,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_4$ -Halogenalkyl,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy,  $C_1$ - $C_4$ -Halogenalkoxy,  $C_1$ - $C_4$ -Alkylthio,  $C_1$ - $C_4$ -Halogenalkylthio, insbesondere Phenyl, 2-Chlorphenyl, 2-Fluorphenyl, 2-Methylphenyl, 2-Trifluormethylphenyl, 2-Methoxyphenyl, 2,4-Dichlorphenyl, 2,6-Dichlorphenyl, 2,6-Difluorphenyl, 2,6-Dimethylphenyl, 2-Chlor-4-trifluormethylphenyl, 2,6-Dichlor-4-trifluormethylphenyl;
- 30  $R^{12}$   
 $C_1$ - $C_4$ -Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl und 1,1-Dimethylethyl, wobei die genannten Reste gegebenenfalls substituiert sind durch Halogen, insbesondere Fluor oder Chlor oder durch Methoxy;  
 $C_3$ - $C_6$ -Cycloalkyl wie Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, gegebenenfalls substituiert durch Chlor oder Fluor;  
 $C_3$ - $C_6$ -Alkenyl wie 1-Propenyl, 2-Propenyl, 1-Methylethenyl, 1-Butenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-1-propenyl, 2-Methyl-1-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl;
- 40 Q  
 Sauerstoff oder  $NR^{14}$   
 $R^{13}$   
 Wasserstoff;
- 45  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl, insbesondere  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl und 1,1-Dimethylethyl, substituiertes Alkyl, z.B. durch Halogen, insbesondere Fluor, Chlor, Brom,  $C_1$ - $C_4$ -Alkoxy, insbesondere Methoxy, Ethoxy;  
 gegebenenfalls substituiertes  $C_3$ - $C_6$ -Cycloalkyl wie bei  $R^3$  genannt, gegebenenfalls durch Methyl, Ethyl substituiert;
- 50  $C_3$ - $C_6$ -Alkenyl wie 2-Propenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl, 2-Pentenyl, 3-Pentenyl, 4-Pentenyl, 1-Methyl-2-butenyl, 2-Methyl-2-butenyl, 3-Methyl-2-butenyl, 1-Methyl-3-butenyl, 2-Methyl-3-butenyl, 3-Methyl-3-butenyl, 1,1-Dimethyl-2-propenyl, 1,2-Dimethyl-2-propenyl, 1-Ethyl-2-propenyl, 2-Hexenyl, 3-Hexenyl, 4-Hexenyl, 5-Hexenyl, 1-Methyl-2-pentenyl, 2-Methyl-2-pentenyl, 3-Methyl-2-pentenyl, 4-Methyl-2-pentenyl, 1-Methyl-3-pentenyl, 2-Methyl-3-pentenyl, 3-Methyl-3-pentenyl, 4-Methyl-3-pentenyl, 1,1-Dimethyl-2-butenyl, 1,1-Dimethyl-3-butenyl, 1,2-Dimethyl-2-butenyl, 1,2-Dimethyl-3-butenyl, 1,3-Dimethyl-2-butenyl, 1,3-Dimethyl-3-butenyl, 2,2-Dimethyl-3-butenyl, 2,3-Dimethyl-2-butenyl, 2,3-Dimethyl-3-butenyl, 3,3-Dimethyl-2-butenyl, 1-Ethyl-2-butenyl, 1-Ethyl-3-butenyl, 2-Ethyl-2-butenyl, 2-Ethyl-3-butenyl, 1,1,2-Trimethyl-2-propenyl;

nyl, 1-Ethyl-1-methyl-2-propenyl und 1-Ethyl-2-methyl-2-propenyl;

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkanyl wie Ethinyl, 1-Propinyl, 2-Propinyl, 1-Butinyl, 2-Butinyl, 3-Butinyl, 1-Methyl-2-propinyl, 1-Pentinyl, 2-Pentinyl, 3-Pentinyl, 4-Pentinyl, 1-Methyl-2-butinyl, 1-Methyl-3-butinyl, 2-Methyl-3-butinyl, 3-Methyl-1-butinyl, 1,1-Dimethyl-2-propinyl, 1-Ethyl-2-propinyl, 1-Hexinyl, 2-Hexinyl, 3-Hexinyl, 4-Hexinyl, 5-Hexinyl, 1-Methyl-2-pentinyl, 1-Methyl-3-pentinyl, 1-Methyl-4-pentinyl, 2-Methyl-3-pentinyl, 2-Methyl-4-pentinyl, 3-Methyl-1-pentinyl, 3-Methyl-4-pentinyl, 4-Methyl-1-pentinyl, 4-Methyl-2-pentinyl, 1,1-Dimethyl-2-butinyl, 1,1-Dimethyl-3-butinyl, 1,2-Dimethyl-3-butinyl, 2,2-Dimethyl-3-butinyl, 3,3-Dimethyl-1-butinyl, 1-Ethyl-2-butinyl, 1-Ethyl-3-butinyl, 2-Ethyl-3-butinyl und 1-Ethyl-1-methyl-2-propinyl;

gegebenenfalls substituiertes Phenyl, z.B. durch Halogen, insbesondere Fluor, Chlor, Brom, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, insbesondere Methyl, Ethyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, insbesondere Trifluormethyl, Difluormethyl, Chlordifluormethyl, Trichlormethyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, insbesondere Methoxy, Ethoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, insbesondere Trifluormethoxy, Difluormethoxy, Chlordifluormethoxy;

R<sup>16</sup>

ein Rest OR<sup>20</sup>, insbesondere Methyl, Ethyl;

15 ein Rest R<sup>13</sup>,

oder gemeinsam mit R<sup>13</sup> eine C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylkette wie Butylen, Pentylen, Hexylen, in der eine Methylengruppe durch Sauerstoff oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyliminogruppe, z.B. Methyl- oder Ethyliminogruppe ersetzt sein kann;

R<sup>15</sup>

20 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl und 1,1-Dimethylethyl;

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl oder Alkinyl, z.B. 2-Propenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl, 2-Butinyl, 2-Propinyl, 3-Butinyl, Cyclopropylmethyl, Cyclopropyl oder Cyclobutyl;

R<sup>16</sup>

25 Wasserstoff;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie bei R<sup>15</sup> genannt, C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl, z.B. 2-Propenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl;

eine C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylkette, in der eine Methylengruppe durch Sauerstoff ersetzt sein kann;

R<sup>17</sup>

30 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie bei R<sup>15</sup> genannt;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, besonders C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-Halogenalkyl wie Chlormethyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl, Chlorfluormethyl, Fluormethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, Dichlorfluormethyl, Chlordifluormethyl, 1-Fluorethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2-Chlor-2-fluorethyl, 2-Chlor-2-difluorethyl, 2,2-Dichlor-2-fluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl und Pentafluorethyl;

35 R<sup>18</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie bei R<sup>15</sup> genannt oder N,N-Dimethylamino;

R<sup>19</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder Halogenalkyl wie bei R<sup>17</sup> genannt,

C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxyalkyl wie Methoxyethyl, Ethoxyethyl;

40 C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl wie 2-Propenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl, gegebenenfalls mit Halogen substituiert, insbesondere Fluor oder Chlor;

C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkanyl wie 2-Propinyl, 2-Butinyl, 3-Butinyl;

Phenyl oder Phenyl substituiert durch ein bis drei Fluor, Chlor, Brom, Methyl oder Methoxy;

n

45 1 oder 2

R<sup>20</sup>

Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl wie bei R<sup>15</sup> genannt;

R<sup>21</sup>

ein Rest R<sup>12</sup>, insbesondere Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Cyclopropyl;

50 Phenyl, Benzyl, gegebenenfalls substituiert z.B. durch Halogen, insbesondere Fluor, Chlor, Brom, Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl insbesondere Methyl, Ethyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, welches gegebenenfalls durch Halogen substituiert ist, insbesondere Methoxy, Ethoxy, 2-Chlorethoxy.

Die erfindungsgemäßen herbiziden und wachstumsregulierenden Verbindungen I bzw. die sie enthaltenden Mittel können beispielsweise in Form von direkt versprühbaren Lösungen, Pulvern, Suspensionen, auch hochprozentigen wässrigen, öligen oder sonstigen Suspensionen oder Dispersionen, Emulsionen, Odispersionen, Pasten, Stäubemitteln, Streumitteln oder Granulaten durch Versprühen, Vernebeln, Verstäuben,



Verstreuen oder Gießen angewendet werden. Die Anwendungsformen richten sich nach den Verwendungszwecken; sie sollten in jedem Fall möglichst die feinste Verteilung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe gewährleisten.

Die Verbindungen I eignen sich allgemein zur Herstellung von direkt versprühbaren Lösungen, Emulsionen, Pasten oder Öldispersionen. Als inerte Zusatzstoffe kommen Mineralölfractionen von mittlerem bis hohem Siedepunkt, wie Kerosin oder Dieselöl, ferner Kohlenterteile, z.B. Toluol, Xylol, Paraffin, Tetrahydronaphthalin, alkylierte Naphthaline oder deren Derivate, Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol, Cyclohexanol, Cyclohexanon, Chlorbenzol, Isophoron oder stark polare Lösungsmittel wie N,N-Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, N-Methylpyrrolidon oder Wasser in Betracht.

Wäßrige Anwendungsformen können aus Emulsionskonzentraten, Dispersionen, Pasten, netzbaren Pulvern oder wasserdispersiblen Granulaten durch Zusatz von Wasser bereitete werden. Zur Herstellung von Emulsionen, Pasten oder Öldispersionen können die Substanzen als solche oder in einem Öl oder Lösungsmittel gelöst, mittels Netz-, Haft-, Dispergier- oder Emulgiermittel in Wasser homogenisiert werden. Es können aber auch aus wirksamer Substanz, Netz-, Haft-, Dispergier- oder Emulgiermittel und eventuell Lösungsmittel oder Öl bestehende Konzentrate hergestellt werden, die zur Verdünnung mit Wasser geeignet sind.

Als oberflächenaktive Stoffe kommen die Alkali-, Erdalkali-, Ammoniumsalze von aromatischen Sulfonsäuren, z.B. Lignin-, Phenol-, Naphthalin- und Dibutyl-naphthalinsulfonsäure, sowie von Fettsäuren, Alkyl- und Alkylarylsulfonaten, Alkyl-, Lauryl- und Fettalkoholsulfaten, sowie Salze sulfatierter Hexa-, Hepta- und Octadecanole, sowie von Fettalkoholglykolether, Kondensationsprodukte von sulfoniertem Naphthalin und seiner Derivate mit Formaldehyd, Kondensationsprodukte des Naphthalins bzw. der Naphthalinsulfonsäuren mit Phenol und Formaldehyd, Polyoxyethylenoctylphenolether, ethoxyliertes Isooctyl-, Octyl- oder Nonylphenol, Alkylphenol-, Tributylphenylpolyglykolether, Alkarylpolyetheralkohole, Isotridecylalkohol, Fettalkoholethylenoxid-Kondensate, ethoxyliertes Rizinusöl, Polyoxyethylenalkylether oder Polyoxypropylen, Laurylalkoholpolyglykoletheracetat, Sorbitester, Lignin-Sulfitablaugen oder Methylcellulose in Betracht.

Pulver-, Streu- und Stäubemittel können durch Mischen oder gemeinsames Vermahlen der wirksamen Substanzen mit einem festen Trägerstoff hergestellt werden.

Granulate, z.B. Umhüllungs-, Imprägnierungs- und Homogengranulate können durch Bindung der Wirkstoffe an feste Trägerstoffe hergestellt werden. Feste Trägerstoffe sind Mineralerden wie Silicagel, Kieselsäuren, Kieselgele, Silikate, Talkum, Kaolin, Kalkstein, Kalk, Kreide, Bolus, Löss, Ton, Dolomit, Diatomeenerde, Calcium- und Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid, gemahlene Kunststoffe, Düngemittel, wie Ammoniumsulfat, Ammoniumphosphat, Ammoniumnitrat, Harnstoffe und pflanzliche Produkte, wie Getreidemehl, Baumrinden-, Holz- und Nußschalenmehl, Cellulosepulver oder andere feste Trägerstoffe.

Die Formulierungen enthalten zwischen 0,1 und 95 Gew.%, vorzugsweise zwischen 0,5 und 90 Gew.%, Wirkstoff. Die Wirkstoffe werden dabei in einer Reinheit von 90 % bis 100 %, vorzugsweise 95 % bis 100 % (nach NMR-Spektrum) eingesetzt.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen I können beispielsweise wie folgt formuliert werden:

I. Man vermischt 90 Gewichtsteile der Verbindung Nr. 40 mit 10 Gewichtsteilen N-Methyl- $\alpha$ -pyrrolidon und erhält eine Lösung, die zur Anwendung in Form kleinster Tropfen geeignet ist.

II. 20 Gewichtsteile der Verbindung Nr. 40 werden in einer Mischung gelöst, die aus 80 Gewichtsteilen Xylol, 10 Gewichtsteilen des Anlagerungsproduktes von 8 bis 10 mol Ethylenoxid an 1 mol Ölsäure-N-monoethanolamid, 5 Gewichtsteilen Calciumsalz der Dodecylbenzolsulfonsäure und 5 Gewichtsteilen des Anlagerungsproduktes von 40 mol Ethylenoxid an 1 mol Ricinusöl besteht. Durch Ausgießen und feines Verteilen der Lösung in 100 000 Gewichtsteilen Wasser erhält man eine wäßrige Dispersion, die 0,02 Gew.% des Wirkstoffs enthält.

III. 20 Gewichtsteile der Verbindung Nr. 40 werden in einer Mischung gelöst, die aus 40 Gewichtsteilen Cyclohexanon, 30 Gewichtsteilen Isobutanol, 20 Gewichtsteilen des Anlagerungsproduktes von 7 mol Ethylenoxid an 1 mol Isooctylphenol und 10 Gewichtsteilen des Anlagerungsproduktes von 40 mol Ethylenoxid an 1 mol Ricinusöl besteht. Durch Eingießen und feines Verteilen der Lösung in 100 000 Gewichtsteilen Wasser erhält man eine wäßrige Dispersion, die 0,02 Gew.% des Wirkstoffs enthält.

IV. 20 Gewichtsteile des Wirkstoffs Nr. 40 werden in einer Mischung gelöst, die aus 25 Gewichtsteilen Cyclohexanon, 65 Gewichtsteilen einer Mineralölfraction vom Siedepunkt 210 bis 280°C und 10 Gewichtsteilen des Anlagerungsproduktes von 40 mol Ethylenoxid an 1 mol Ricinusöl besteht. Durch Eingießen und feines Verteilen der Lösung in 100 000 Gewichtsteilen Wasser erhält man eine wäßrige Dispersion, die 0,02 Gew.% des Wirkstoffs enthält.

V. 20 Gewichtsteile des Wirkstoffs Nr. 40 werden mit 3 Gewichtsteilen des Natriumsalzes der Diisobutyl-naphthalin- $\alpha$ -sulfonsäure, 17 Gewichtsteilen des Natriumsalzes einer Ligninsulfonsäure aus einer Sulfit-Ablauge und 60 Gewichtsteilen pulverförmigem Kieselsäuregel gut vermischt und in einer Hammermühle vermahlen. Durch feines Verteilen der Mischung in 20 000 Gewichtsteilen Wasser erhält man eine Spritzbrühe, die 0,1 Gew.-% des Wirkstoffs enthält.

VI. 3 Gewichtsteile des Wirkstoffs Nr. 40 werden mit 97 Gewichtsteilen feinteiligem Kaolin vermischt. Man erhält auf diese Weise ein Stäubemittel, das 3 Gew.-% des Wirkstoffs enthält.

VII. 30 Gewichtsteile des Wirkstoffs Nr. 40 werden mit einer Mischung aus 92 Gewichtsteilen pulverförmigem Kieselsäuregel und 8 Gewichtsteilen Paraffinöl, das auf die Oberfläche dieses Kieselsäuregels gesprüht wurde, innig vermischt. Man erhält auf diese Weise eine Aufbereitung des Wirkstoffs mit guter Haftfähigkeit.

VIII. 20 Gewichtsteile des Wirkstoffs Nr. 40 werden mit 2 Gewichtsteilen Calciumsalz der Dodecylbenzolsulfonsäure, 8 Gewichtsteilen Fettkohol-polyglykolether, 2 Gewichtsteilen Natriumsalz eines Phenol-Harnstoff-Formaldehyd-Kondensates und 68 Gewichtsteilen eines paraffinischen Mineralöls innig vermischt. Man erhält eine stabile ölige Dispersion.

Die Applikation der herbiziden und wachstumsregulierenden Mittel bzw. der Wirkstoffe kann im Vorauf- oder im Nachaufverfahren erfolgen. Sind die Wirkstoffe für gewisse Kulturpflanzen weniger verträglich, so können Ausbringungstechniken angewandt werden, bei welchen die herbiziden Mittel mit Hilfe der Spritzgeräte so gespritzt werden, daß die Blätter der empfindlichen Kulturpflanzen nach Möglichkeit nicht getroffen werden, während die Wirkstoffe auf die Blätter darunter wachsender unerwünschter Pflanzen oder die unbedeckte Bodenfläche gelangen (post-directed, lay-by).

Die Aufwandmengen an Wirkstoff bei Anwendung als Herbizide betragen je nach Bekämpfungsziel, Jahreszeit, Zielpflanzen und Wachstumsstadium 0,001 bis 3, vorzugsweise 0,01 bis 2 kg/ha aktive Substanz (a.S.).

Die Verbindungen der Formel I können praktisch alle Entwicklungsstadien einer Pflanze verschiedenartig beeinflussen und werden deshalb als Wachstumsregulatoren eingesetzt. Die Wirkungsvielfalt der Pflanzenwachstumsregulatoren hängt ab vor allem

- a) von der Pflanzenart und -sorte,
- b) von dem Zeitpunkt der Applikation, bezogen auf das Entwicklungsstadium der Pflanze und von der Jahreszeit,
- c) von dem Applikationsort und -verfahren z.B. Samenbeize, Bodenbehandlung, Blattapplikation oder Staminjektion bei Bäumen
- d) von klimatischen Faktoren, z.B. Temperatur, Niederschlagsmenge, außerdem auch Tageslänge und Lichtintensität
- e) von der Bodenbeschaffenheit (einschließlich Düngung),
- f) von der Formulierung bzw. Anwendungsform des Wirkstoffs und schließlich
- g) von den angewendeten Konzentrationen der aktiven Substanz.

Aus der Reihe der verschiedenartigen Anwendungsmöglichkeiten der erfindungsgemäßen Pflanzenwachstumsregulatoren der Formel I im Pflanzenanbau, in der Landwirtschaft und im Gartenbau, werden einige nachstehend erwähnt.

A. Mit den erfindungsgemäß verwendbaren Verbindungen läßt sich das vegetative Wachstum der Pflanzen stark hemmen, was sich insbesondere in einer Reduzierung des Längenwachstums äußert. Die behandelten Pflanzen weisen demgemäß einen gedrunghenen Wuchs auf; außerdem ist eine dunklere Blattfärbung zu beobachten.

Als vorteilhaft für die Praxis erweist eine verminderte Intensität des Wachstums von Gräsern an Straßenrändern, Hecken, Kanalböschungen und auf Rasenflächen wie Park-, Sport- und Obstanlagen, Zierrasen und Flugplätzen, so daß der Arbeits- und kostenaufwendige Rasenschnitt reduziert werden kann.

Von wirtschaftlichem Interesse ist auch die Erhöhung der Standfestigkeit von lageranfälligen Kulturen wie Getreide, Mais, Sonnenblumen und Soja. Die dabei verursachte Halmerverkürzung und Halmerverdünnung verringern oder beseitigen die Gefahr des "Lagerns" (des Umknickens) von Pflanzen unter ungünstigen Witterungsbedingungen vor der Ernte.

Wichtig ist auch die Anwendung von Wachstumsregulatoren zur Hemmung des Längenwachstums und zur zeitlichen Veränderung des Reifeverlaufs bei Baumwolle. Damit wird ein vollständig mechanisiertes Beernten dieser wichtigen Kulturpflanze ermöglicht.

Bei Obst- und anderen Bäumen lassen sich mit den Wachstumsregulatoren Schnittkosten einsparen. Außerdem kann die Alternanz von Obstbäumen durch Wachstumsregulatoren gebrochen werden.

Durch Anwendung von Wachstumsregulatoren kann auch die seitliche Verzweigung der Pflanzen vermehrt oder gehemmt werden. Daran besteht Interesse, wenn z.B. bei Tabakpflanzen die Ausbildung von Seitentrieben (Geiztrieben) zugunsten des Blattwachstums gehemmt werden soll.

Mit Wachstumsregulatoren läßt sich beispielsweise bei Wintererbsen auch die Frostresistenz erheblich erhöhen. Dabei werden einerseits das Längenwachstum und die Entwicklung einer zu üppigen (und dadurch besonders frostanfälligen) Blatt- bzw. Pflanzenmasse gehemmt. Andererseits werden die jungen Rapspflanzen nach der Aussaat und vor dem Einsetzen der Winterfröste trotz günstiger Wachstumsbedingungen im vegetativen Entwicklungsstadium zurückgehalten. Dadurch wird auch die Frostgefährdung solcher Pflanzen beseitigt, die zum vorzeitigen Abbau der Blühhemmung und zum Übergang in die generativen Phase neigen. Auch bei anderen Kulturen, z.B. Wintergetreide ist es vorteilhaft, wenn die Bestände durch Behandlung mit erfindungsgemäßen Verbindungen im Herbst zwar gut bestockt werden, aber nicht zu üppig in den Winter hineingehen. Dadurch kann der erhöhten Frostempfindlichkeit und -wegen der relativ geringen Blatt- bzw. Pflanzenmasse - dem Befall mit verschiedenen Krankheiten (z.B. Pilzkrankheit) vorgebeugt werden. Die Hemmung des vegetativen Wachstums ermöglicht außerdem bei vielen Kulturpflanzen eine dichtere Bepflanzung des Bodens, so daß ein Mehrertrag bezogen auf die Bodenfläche erzielt werden kann.

B. Mit den Wachstumsregulatoren lassen sich Mehrerträge sowohl an Pflanzenteilen als auch an Pflanzeninhaltsstoffen erzielen. So ist es beispielsweise möglich, das Wachstum größerer Mengen an Knospen, Blüten, Blättern, Früchten, Samenkörnern, Wurzeln und Knollen zu induzieren, den Gehalt an Zucker in Zuckerrüben, Zuckerrohr sowie Zitrusfrüchten zu erhöhen, den Proteingehalt in Getreide oder Soja zu steigern oder Gummibäume zum vermehrten Latexfluß zu stimulieren.

Dabei können die Verbindungen der Formel I Ertragssteigerungen durch Eingriffe in den pflanzlichen Stoffwechsel bzw. durch Förderung oder Hemmung des vegetativen und/oder des generativen Wachstums verursachen.

C. Mit Pflanzenwachstumsregulatoren lassen sich schließlich sowohl eine Verkürzung bzw. Verlängerung der Entwicklungsstadien als auch eine Beschleunigung bzw. Verzögerung der Reife der geernteten Pflanzenteile vor oder nach der Ernte erreichen.

Von wirtschaftlichem Interesse ist beispielsweise die Ernteerleichterung, die durch das zeitlich konzentrierte Abfallen oder Vermindern der Haltfestigkeit am Baum bei Zitrusfrüchten, Oliven oder bei anderen Arten und Sorten von Kern-, Stein- und Schalenobst ermöglicht wird. Derselbe Mechanismus, das heißt die Förderung der Ausbildung von Trenngewebe zwischen Frucht- bzw. Blatt- und Sproßteil der Pflanze ist auch für ein gut kontrollierbares Entblättern von Nutzpflanzen wie beispielsweise Baumwolle wesentlich.

D. Mit Wachstumsregulatoren kann weiterhin der Wasserverbrauch von Pflanzen reduziert werden. Dies ist besonders wichtig für landwirtschaftliche Nutzflächen, die unter einem hohen Kostenaufwand künstlich bewässert werden müssen, z.B. in ariden oder semiariden Gebieten. Durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Substanzen läßt sich die Intensität der Bewässerung reduzieren und damit eine kostengünstigere Bewirtschaftung durchführen. Unter dem Einfluß von Wachstumsregulatoren kommt es zu einer besseren Ausnutzung des vorhandenen Wassers, weil u.a.

- die Öffnungsweite der Stomata reduziert wird
- eine dickere Epidermis und Cuticula ausgebildet werden
- die Durchwurzelung des Bodens verbessert wird und
- das Mikroklima im Pflanzenbestand durch einen kompakteren Wuchs günstig beeinflußt wird.

Die erfindungsgemäß zu verwendenden Wachstumsregulatoren der Formel I können den Kulturpflanzen sowohl vom Samen her (als Saatgutbeizmittel) als auch über den Boden, d.h. durch die Wurzel sowie - besonders bevorzugt - durch Spritzung über das Blatt zugeführt werden.

Infolge der hohen Pflanzenverträglichkeit kann die Aufwandmenge stark variiert werden.

In Anbetracht der Vielseitigkeit der Applikationsmethoden können die erfindungsgemäßen Verbindungen bzw. sie enthaltende Mittel in einer großen Zahl von Kulturpflanzen zur Beseitigung unerwünschter Pflanzen eingesetzt werden.

## Kulturenliste:

	Botanischer Name	Deutscher Name
5	Allium cepa	Küchenzwiebel
	Ananas comosus	Ananas
	Arachis hypogaea	Erndnuß
	Asparagus officinalis	Spargel
10	Beta vulgaris spp. altissima	Zuckerrübe
	Beta vulgaris spp. rapa	Futterrübe
	Brassica napus var. napus	Raps
	Brassica napus var. napobrassica	Kohlrübe
	Brassica rapa var. silvestris	Rübsen
15	Camellia sinensis	Teestrauch
	Carthamus tinctorius	Saflor - Färberdistel
	Carya illinoensis	Pekannußbaum
	Citrus limon	Zitrone
20	Citrus sinensis	Apfelsine, Orange
	Coffea arabica (Coffea canephora, Coffea liberica)	Kaffee
	Cucumis sativus	Gurke
25	Cynodon dactylon	Bermudagrass
	Daucus carota	Möhre
	Elaeis guineensis	Ölpalme
	Fragaria vesca	Erdbeere
	Glycine max	Sojabohne
30	Gossypium hirsutum (Gossypium arborescens, Gossypium herbaceum, Gossypium vitifolium)	Baumwolle
	Helianthus annuus	Sonnenblume
35	Hevea brasiliensis	Parakautschukbaum
	Hordeum vulgare	Gerste
	Humulus lupulus	Hopfen
	Ipomoea batatas	Süßkartoffel
40	Juglans regia	Walnußbaum
	Lens culinaris	Linse
	Linum usitatissimum	Faserlein
	Lycopersicon lycopersicum	Tomate
45	Malus spp.	Apfel
	Manihot esculenta	Maniok
	Medicago sativa	Luzerne
	Musa spp.	Obst- und Mehlbanane
50	Nicotiana tabacum (N. rustica)	Takak
	Olea europaea	Ölbaum

	Botanischer Name	Deutscher Name
	<i>Oryza sativa</i>	Reis
	<i>Phaseolus lunatus</i>	Mondbohne
5	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Buschbohne
	<i>Picea abies</i>	Rotfichte
	<i>Pinus</i> spp.	Kiefer
	<i>Pisum sativum</i>	Gartenerbse
10	<i>Prunus avium</i>	Süßkirsche
	<i>Prunus persica</i>	Pfirsich
	<i>Pyrus communis</i>	Birne
	<i>Ribes sylvestre</i>	Rote Johannisbeere
15	<i>Ricinus communis</i>	Rizinus
	<i>Saccharum officinarum</i>	Zuckerrohr
	<i>Secale cereale</i>	Roggen
	<i>Solanum tuberosum</i>	Kartoffel
20	<i>Sorghum bicolor</i> (s. <i>vulgare</i> )	Mohrenhirse
	<i>Theobroma cacao</i>	Kakaobaum
	<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee
	<i>Triticum aestivum</i>	Weizen
25	<i>Triticum durum</i>	Hartweizen
	<i>Vicia faba</i>	Pferdeböhen
	<i>Vitis vinifera</i>	Weinrebe
	<i>Zea mays</i>	Mais

30 Zur Verbreiterung des Wirkungsspektrums und zur Erzielung synergistischer Effekte können die erfindungsgemäßen Verbindungen I mit zahlreichen Vertretern anderer herbizider oder wachstumsregulierender Wirkstoffgruppen gemischt und gemeinsam ausgebracht werden. Beispielsweise kommen als Mischungspartner Diazin, 4H-3, 1-Benzoxazinderivate, Benzothiadiazine, 2,6-Dinitroaniline, N-Phenylcarbamate, Thiocarbamate, Halogen-carbonsäuren, Triazine, Amide, Harnstoffe, Diphenylether, Triazinone, Uracile, Benzofuranderivate, Cyclohexan-1,3-dionderivate, Chinolincarbonsäurederivate, Sulfoniharnstoffderivate, Aryloxy-, Heteroaryloxyphenoxypyropionsäuren sowie deren Salze, Ester und Amide und andere in Betracht.

Außerdem kann es von Nutzen sein, die Verbindungen I allein oder in Kombination mit anderen Herbiziden auch noch mit weiteren Pflanzenschutzmitteln gemischt gemeinsam auszubringen, beispielsweise mit Mitteln zur Bekämpfung von Schädlingen oder phytopathogenen Pilzen bzw. Bakterien. Von Interesse ist ferner die Mischbarkeit mit Mineralsalzlösungen, welche zur Behebung von Ernährungs- und Spurenelementmängeln eingesetzt werden. Es können auch nichtphytotoxische Öle und Ölkonzentrate zugesetzt werden.

Die nachstehenden Beispiele beschreiben exemplarisch die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen.

#### 45 Beispiel 1

N-(2-Methoxycarbonylphenylsulfonyl)-1,5-dimethylpyrazol-3-carboxamid

50 In 200 ml absolutem Aceton werden 10,8 g 2-Methoxycarbonylphenylsulfonamid, 8,6 g 1,5-Dimethylpyrazol-3-carbonsäurechlorid und 13,8 g Kaliumcarbonat 8 h unter Rückfluß erhitzt. Nach Abdestillieren des Lösungsmittels wird der Rückstand in Wasser aufgenommen und ein pH-Wert von 2 eingestellt. Der sich bildende Niederschlag wird abgesaugt und mit H<sub>2</sub>O neutral gewaschen. Nach Verrühren mit Ether wird der Rückstand abgesaugt und am Vakuum getrocknet. Man erhält 11,8 g N-(2-Methoxycarbonylphenylsulfonyl)-1,5-dimethylpyrazol-3-carboxamid mit einem Schmelzpunkt von 176-177°C (Wirkstoffbeispiel Nr. 40).

## Beispiel 2

## N-(2-Thienylsulfonyl)-1-methylpyrazol-4-carboxamid

- 3,8 g 1-Methylpyrazol-4-carbonsäure und 4,9 g Carbonyldiimidazol werden in 100 ml 1,2-Dichlorethan 3,5 h auf 55°C erwärmt. Nach Zugabe von 4,9 g 2-Thienylsulfonamid und 5,4 ml Triethylamin erhitzt man weitere 13 h auf 55°C. Nach Abkühlen werden 40 ml 10 %-ige wäßrige NaOH-Lösung zugegeben, anschließend die wäßrige Phase auf pH 1 gestellt. Der sich bildende Niederschlag wird abgetrennt und am Vakuum getrocknet. Man erhält 5,2 g N-(2-Thienylsulfonyl)-1-methylpyrazol-4-carboxamid mit einem Schmelzpunkt von 174-180°C (Wirkstoffbeispiel Nr. 103).

## Beispiel 3

## N-(2-Chlorphenylsulfonyl)-1,4-dimethylimidazol-2-carboxamid

- In 200 ml Toluol werden 2,0 g 1,4-Dimethylimidazol und 4,3 g 2-Chlorphenylsulfonylisocyanat 6 h unter Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen wird der sich bildende Niederschlag abgesaugt und mit Aceton gewaschen. Der Rückstand wird in Acetonitril/Methanol suspendiert und 0,5 h unter Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen wird der Feststoff abgesaugt und am Vakuum getrocknet. Man erhält 2,3 g N-(2-Chlorphenylsulfonyl)-1,4-dimethylimidazol-2-carboxamid mit einem Schmelzpunkt von 230-231°C. (Wirkstoffbeispiel Nr. 113).

## Beispiel 4

## N-(2,6-Dichlorphenylsulfonyl)-2-methoxythiazol-4-carboxamid

- 2,3 g N-(2,6-Dichlorphenylsulfonyl)-2-bromthiazol-4-carboxamid und 1,6 g Natriummethanolat werden in 45 ml Methanol 12 h unter Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen saugt man den Niederschlag ab, wäscht mit Methanol und trocknet anschließend den Rückstand am Vakuum. Man erhält 1,8 g N-(2,6-Dichlorphenylsulfonyl)-2-methoxythiazol-4-carboxamid mit einem Schmelzpunkt von 162-165°C. (Wirkstoffbeispiel Nr. 34).
- Entsprechend können durch Wahl der Ausgangsstoffe und entsprechende Anpassung der Verfahrensbedingungen die nachstehend in Tabelle 1 aufgelisteten Verbindungen erhalten werden, worin die folgenden Substituenten A vorliegen.


EP 0 482 349 A2

5	A1-1 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = H
	A1-2 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = H
	A1-3 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = H
10	A1-4 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 6-Cl, R <sup>4</sup> = H
	A1-5 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 6-OCH <sub>3</sub> , R <sup>4</sup> = H
	A1-6 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 6-CH <sub>3</sub> , R <sup>4</sup> = H
15	A1-7 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 6-F, R <sup>4</sup> = H
	A1-8 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 3-Cl, R <sup>4</sup> = H
	A1-9 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 3-F, R <sup>4</sup> = H
20	A1-10 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 4-Cl, R <sup>4</sup> = H
	A1-11 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 5-Cl, R <sup>4</sup> = H
	A1-12 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 5-F, R <sup>4</sup> = H
25	A1-13 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 5-OCH <sub>3</sub> , R <sup>4</sup> = H
	A1-14 :	R <sup>2</sup> = CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 5-OCHF <sub>2</sub> , R <sup>4</sup> = H
	A1-15 :	R <sup>2</sup> = CO N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = H
30	A1-16 :	R <sup>2</sup> = CO N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	R <sup>3</sup> = 3-Cl, R <sup>4</sup> = H
	A1-17 :	R <sup>2</sup> = CO N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	R <sup>3</sup> = 3-F, R <sup>4</sup> = H
	A1-18 :	R <sup>2</sup> = CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = H, R <sup>4</sup> = H
35	A1-19 :	R <sup>2</sup> = CH <sub>2</sub> Cl	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = H
	A1-20 :	R <sup>2</sup> = CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = H
	A1-21 :	R <sup>2</sup> = CH <sub>2</sub> SCCH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = H
40	A1-22 :	R <sup>2</sup> = CF <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup> = H
	A1-23 :	R <sup>2</sup> = CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 5-Cl, R <sup>4</sup> = H
	A1-24 :	R <sup>2</sup> = CH <sub>3</sub>	R <sup>3</sup> = 5-CH <sub>3</sub> , R <sup>4</sup> = H

	A1-25:	$R^2 = CH_3$	$R^3 = 5-OCH_3,$	$R^4 = H$
5	A1-26:	$R^2 = F$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-27:	$R^2 = F$	$R^3 = 6-F,$	$R^4 = H$
	A1-28:	$R^2 = Cl$	$R^3, R^4 = H$	
10	A1-29:	$R^2 = Cl$	$R^3 = 6-Cl,$	$R^4 = H$
	A1-30:	$R^2 = Cl$	$R^3 = 6-CH_3,$	$R^4 = H$
	A1-31:	$R^2 = Cl$	$R^3 = 6-OCH_3,$	$R^4 = H$
	A1-32:	$R^2 = Cl$	$R^3 = 5-CO_2CH_3,$	$R^4 = H$
15	A1-33:	$R^2 = Cl$	$R^3 = 5-Cl,$	$R^4 = H$
	A1-34:	$R^2 = Cl$	$R^3 = 3-Cl,$	$R^4 = H$
	A1-35:	$R^2 = Cl$	$R^3 = 6-Cl,$	$R^4 = 5-Cl$
20	A1-36:	$R^2 = Cl$	$R^3 = 6-Cl,$	$R^4 = 4-Cl$
	A1-37:	$R^2 = Br$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-38:	$R^2 = Br$	$R^3 = 6-Br,$	$R^4 = H$
25	A1-39:	$R^2 = CN$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-40:	$R^2 = OCH_3$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-41:	$R^2 = OCH_2CH_3$	$R^3, R^4 = H$	
30	A1-42:	$R^2 = OCH(CH_3)_2$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-43:	$R^2 = OCH_2CH_2Cl$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-44:	$R^2 = CH_2CH_2OCH_3$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-45:	$R^2 = OCH_2CF_3$	$R^3, R^4 = H$	
35	A1-46:	$R^2 = OCF_3$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-47:	$R^2 = OCF_2H$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-48:	$R^2 = OCH_3$	$R^3 = 5-Br,$	$R^4 = H$
	A1-49:	$R^2 = OCH_3$	$R^3 = 5-OCH_3,$	$R^4 = H$
40				
	A1-50:	$R^2 = OCH_2CF_3$	$R^3 = 5-OCH_2CF_3,$	$R^4 = H$
	A1-51:	$R^2 = SCH_3$	$R^3, R^4 = H$	
45	A1-52:	$R^2 = SCH_2CH_3$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-53:	$R^2 = SO_2CH_3$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-54:	$R^2 = SO_2CH_2CH_3$	$R^3, R^4 = H$	
50	A1-55:	$R^2 = SO_2CH_2CH_2CH_3$	$R^3, R^4 = H$	
	A1-56:	$R^2 = SO_2CH(CH_3)_2$	$R^3, R^4 = H$	

55



	A1-57:	$R^2 = \text{SO}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$	$R^3, R^4 = \text{H}$	
5	A1-58:	$R^2 = \text{OSO}_2\text{CH}_3$	$R^3, R^4 = \text{H}$	
	A1-59:	$R^2 = \text{OSO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	$R^3, R^4 = \text{H}$	
	A1-60:	$R^2 = \text{COCH}_3$	$R^3, R^4 = \text{H}$	
10	A1-61:	$R^2 = $ 	$R^3, R^4 = \text{H}$	
15	A2-1:	$R^5 = \text{H}$	$R^6 = \text{H}$	
	A2-2:	$R^5 = \text{CO}_2\text{CH}_3$	$R^6 = \text{H}$	
	A2-3:	$R^5 = \text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	$R^6 = \text{H}$	
	A2-4:	$R^5 = \text{CON}(\text{CH}_3)_2$	$R^6 = \text{H}$	
20	A2-5:	$R^5 = \text{Cl}$	$R^6 = \text{H}$	
	A2-6:	$R^5 = \text{CF}_3$	$R^6 = \text{H}$	
	A2-7:	$R^5 = \text{OCH}_2\text{CH}_3$	$R^6 = \text{H}$	
25	A2-8:	$R^5 = \text{SO}_2\text{CH}_3$	$R^6 = \text{H}$	
	A2-9:	$R^5 = \text{SO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	$R^6 = \text{H}$	
30	A3-1:	$R^5 = \text{H}$	$R^6 = \text{H}$	
	A3-2:	$R^5 = \text{CON}(\text{CH}_3)_2$	$R^6 = \text{H}$	
35	A6-1:	$R^5 = \text{H}$	$R^4 = \text{H}$	$X = \text{S}$
	A6-2:	$R^5 = \text{Cl}$	$R^4 = \text{H}$	$X = \text{S}$
	A6-3:	$R^5 = \text{H}$	$R^4 = 4\text{-Cl}$	$X = \text{S}$
	A6-4:	$R^5 = \text{H}$	$R^4 = 5\text{-Cl}$	$X = \text{S}$
	A6-5:	$R^5 = \text{CO}_2\text{CH}_3$	$R^4 = \text{H}$	$X = \text{S}$
40	A7-1:	$R^6 = \text{H}$	$R^7 = \text{CO}_2\text{CH}_3$	$X = \text{S}$
	A7-2:	$R^6 = \text{H}$	$R^7 = \text{CON}(\text{CH}_3)_2$	$X = \text{S}$
45	A8-1:	$R^6 = \text{H}$	$R^7 = \text{CO}_2\text{CH}_3$	$X = \text{S}$
	A9-1:	$R^5 = \text{H}$	$R^4 = \text{H}$	
	A9-2:	$R^5 = 2\text{-CO}_2\text{CH}_3$	$R^4 = \text{H}$	
	A9-3:	$R^5 = 2\text{-Cl}$	$R^4 = \text{H}$	
50	A9-4:	$R^5 = 8\text{-CO}_2\text{CH}_3$	$R^4 = \text{H}$	
	A9-5:	$R^5 = 8\text{-Cl}$	$R^4 = \text{H}$	

# EP 0 482 349 A2

5  
 A9 -6:  $R^5 = 8-OCH_3$   $R^4 = H$   
 A9 -7:  $R^5 = 8-OCH_2CH_2OCH_3$   $R^4 = H$   
 A9 -8:  $R^5 = 8-OCH_2CH_2Cl$   $R^4 = H$

10  
 A10-1:  $R^5 = H$   $R^4 = H$   
 A10-2:  $R^5 = 1-CO_2CH_3$   $R^4 = H$   
 A10-3:  $R^5 = 1-Cl$   $R^4 = H$   
 A10-4:  $R^5 = 1-OCH_2CH_2OCH_3$   $R^4 = H$   
 A10-5:  $R^5 = 1-OCH_2CH_2Cl$   $R^4 = H$

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle I

5

$$\text{A-SO}_2\text{-N}\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C-B} \\ | \\ \text{H} \end{array}$$

Nr.	A	B	Fp (°C)
1	A1-1	2-Furyl	
2	A1-26	2-Furyl	158-160
3	A1-29	2-Furyl	
4	A1-1	2,5-Dimethyl-3-furyl	148-150
5	A1-11	2,5-Dimethyl-3-furyl	
6	A1-1	5-Nitro-2-furyl	
7	A6-1	5-Nitro-2-furyl	
8	A1-40	5-Chlor-2-thienyl	175-177
9	A1-1	5-Chlor-2-thienyl	
10	A1-1	5-Methyl-2-thienyl	180-181
11	A1-18	5-Methyl-2-thienyl	
12	A1-1	2-Pyrrolyl	220
13	A1-29	2-Pyrrolyl	210
14	A1-1	1-Methyl-2-pyrrolyl	162-164
15	A1-28	1-Methyl-2-pyrrolyl	
16	A1-1	3-IsoxazolyI	
17	A1-26	3-IsoxazolyI	170-171
18	A1-29	5-Methyl-3-isoxazolyI	138
19	A1-1	5-Methyl-3-isoxazolyI	
20	A1-1	5-Chlormethyl-3-isoxazolyI	
21	A1-40	5-Chlormethyl-3-isoxazolyI	
22	A1-30	5-Phenyl-3-isoxazolyI	200-202
23	A1-1	3-Methyl-4-isoxazolyI	142-143
24	A1-1	3,5-Dimethyl-4-isoxazolyI	
25	A1-28	3,5-Dimethyl-4-isoxazolyI	
26	A1-1	5-IsoxazolyI	
27	A1-27	5-IsoxazolyI	123-127
28	A1-1	3-Methyl-5-isoxazolyI	137-139
29	A1-30	3-Methyl-5-isoxazolyI	
30	A1-1	2-Brom-4-thiazolyI	
31	A1-29	2-Brom-4-thiazolyI	>230
32	A1-30	2-Brom-4-thiazolyI	151
33	A1-1	2-Methoxy-4-thiazolyI	
34	A1-29	2-Methoxy-4-thiazolyI	162-165
35	A1-30	2-Methoxy-4-thiazolyI	138
36	A1-1	2-Methyl-4-thiazolyI	

55

## EP 0 482 349 A2

	Nr.	A	B	Fp (°C)
5	37	A1-29	2-Methyl-4-thiazolyl	
	38	A1-1	4-Methyl-2-thiazolyl	
	39	A1-30	4-Methyl-2-thiazolyl	
	40	A1-1	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	176-177
10	41	A1-29	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	135-138
	42	A1-30	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	123
	43	A1-28	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	89- 91
	44	A1-40	1,4-Dimethyl-3-pyrazolyl	123
15	45	A1-18	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	144-145
	46	A1-27	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	145-147
	47	A1-33	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	172-178
	48	A1-11	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	172-174
20	49	A1-10	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	166-169
	50	A1-9	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	168-169
	51	A1-2	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	124-125
	52	A1-3	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	
25	53	A1-15	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	201-203
	54	A2-9	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	185-188
	55	A7-1	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	140-142
	56	A9-1	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	125-128
30	57	A1-1	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	204-205
	58	A1-28	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	200-201
	59	A1-26	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	194-195
	60	A1-30	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	205-206
35	61	A1-29	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	210
	62	A1-27	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	192-193
	63	A1-9	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	192-193
	64	A1-2	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	180-182
40	65	A1-3	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	
	66	A2-9	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	
	67	A1-1	4-Chlor-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	192-194
	68	A1-11	4-Chlor-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	196-197
45	69	A1-29	4-Chlor-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	210
	70	A1-30	4-Chlor-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	194-195
	71	A1-40	4-Chlor-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	201-204
	72	A1-1	1,4-Dimethyl-3-pyrazolyl	
50	73	A1-2	1,4-Dimethyl-3-pyrazolyl	
	74	A1-28	1,4-Dimethyl-3-pyrazolyl	
	75	A1-27	1,4-Dimethyl-3-pyrazolyl	
	76	A1-30	1,4-Dimethyl-3-pyrazolyl	
55	77	A1-1	1,4,5-Trimethyl-3-pyrazolyl	184-186
	78	A1-29	1,4,5-Trimethyl-3-pyrazolyl	145-146
	79	A1-40	1,4,5-Trimethyl-3-pyrazolyl	

85

## EP 0 482 349 A2

	Nr.	A	B	Fp. (°C)
5	80	A1-1	4-Ethoxycarbonyl-1-methyl-3-pyrazolyl	162-164
	81	A1-30	4-Ethoxycarbonyl-1-methyl-3-pyrazolyl	197-200
	82	A1-1	1-Ethyl-5-methyl-3-pyrazolyl	35- 37
	83	A1-11	1-Ethyl-5-methyl-3-pyrazolyl	62- 63
	84	A1-27	1-Ethyl-5-methyl-3-pyrazolyl	
10	85	A1-43	1-Ethyl-5-methyl-3-pyrazolyl	
	86	A1-29	1-Ethyl-5-methyl-3-pyrazolyl	171-173
	87	A1-1	1-Isopropyl-5-methyl-3-pyrazolyl	156-158
	88	A1-29	1-Isopropyl-5-methyl-3-pyrazolyl	206-208
	89	A1-40	1-Isopropyl-5-methyl-3-pyrazolyl	
15	90	A1-1	1-Methyl-1, 4, 5, 6-tetrahydrocyclopentapyrazol-3-yl	187-188
	91	A1-28	1-Methyl-1, 4, 5, 6-tetrahydrocyclopentapyrazol-3-yl	
	92	A1-30	1-Methyl-1, 4, 5, 6-tetrahydrocyclopentapyrazol-3-yl	
	93	A1-40	1-Methyl-1, 4, 5, 6-tetrahydrocyclopentapyrazol-3-yl	
	94	A1-1	1-Methyl-4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	157-158
20	95	A1-26	1-Methyl-4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	134-135
	96	A1-43	1-Methyl-4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	
	97	A1-2	1-Methyl-4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	
	98	A1-1	1, 3-Dimethyl-5-pyrazolyl	158-162
	99	A1-30	1, 3-Dimethyl-5-pyrazolyl	203
25	100	A1-29	1, 3-Dimethyl-5-pyrazolyl	>230
	101	A1-1	1-Methyl-4-pyrazolyl	174-178
	102	A1-30	1-Methyl-4-pyrazolyl	208
	103	A6-1	1-Methyl-4-pyrazolyl	174-180
	104	A9-1	1-Methyl-4-pyrazolyl	220-227
30	105	A1-1	5-Cyclopropyl-1-methyl-3-pyrazolyl	150-152
	106	A1-27	5-Cyclopropyl-1-methyl-3-pyrazolyl	
	107	A1-30	5-Cyclopropyl-1-methyl-3-pyrazolyl	148-150
	108	A1-40	5-Cyclopropyl-1-methyl-3-pyrazolyl	
	109	A1-1	5-Ethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	
35	110	A1-15	5-Ethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	
	111	A1-30	5-Ethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	
	112	A1-43	5-Ethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	
	113	A1-28	1, 4-Dimethyl-2-imidazolyl	230-231
	114	A1-1	1, 4-Dimethyl-2-imidazolyl	
40	115	A1-28	1-Methyl-2-imidazolyl	162-165
	116	A1-1	1-Methyl-2-imidazolyl	
	117	A1-29	1-Methyl-2-imidazolyl	
	118	A1-1	1-Methyl-5-imidazolyl	220
	119	A1-26	1-Methyl-5-imidazolyl, Na-Salz	>300
45	120	A1-30	1-Methyl-5-imidazolyl	255
	121	A1-30	1-Methyl-5-imidazolyl, Na-Salz	>300

## EP 0 482 349 A2

Nr.	A	B	Fp (°C)
	122 A1-40	1-Methyl-5-imidazolyl	260-265
	123 A1-29	1-Methyl-5-imidazolyl	295-300
5	124 A1-1	2-Methyl-4-oxazolyl	
	125 A1-26	2-Methyl-4-oxazolyl	
	126 A1-30	2-Methyl-4-oxazolyl	
	127 A1-44	2-Methyl-4-oxazolyl	
10	128 A1-1	2-Cyclopropyl-4-oxazolyl	110-112
	129 A1-2	2-Cyclopropyl-4-oxazolyl	
	130 A1-27	2-Cyclopropyl-4-oxazolyl	164-166
	131 A9-1	2-Cyclopropyl-4-oxazolyl	
15	132 A1-1	1,2,3-Thiadiazolyl-4-yl	110
	133 A1-28	1,2,3-Thiadiazolyl-4-yl	173-176
	134 A1-29	1,2,3-Thiadiazolyl-4-yl	>230
	135 A1-33	1,2,3-Thiadiazolyl-4-yl	139
20	136 A1-1	4-Methyl-1,2,3-thiadiazolyl-5-yl	
	137 A1-28	4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl	
	138 A1-27	4-Chlor-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	198-200
	139 A1-1	5-Phenyl-3-isoxazolyl	205-206
25	140 A1-11	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	>210
	141 A1-26	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	146-147
	142 A1-22	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	152-153
	143 A1-28	5-Methyl-3-isoxazolyl	190-191
30	144 A2-4	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	191-192
	145 A1-49	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	153-155
	146 A1-1	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	>220
	147 A1-1	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl, Ca-Salz	>220
35	148 A1-11	1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta-pyrazol-3-yl	184-187
	149 A1-27	5-Methyl-3-isoxazolyl	160-161
	150 A1-22	5-Methyl-3-isoxazolyl	160-162
	151 A1-10	2-Cyclopropyl-4-oxazolyl	150-152
40	152 A1-30	2-Cyclopropyl-4-oxazolyl	131-132
	153 A1-22	2-Cyclopropyl-4-oxazolyl	129-131
	154 A1-44	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	83- 85
	155 A6-1	1,5-Dimethyl-3-pyrazolyl	130-132
45	156 A1-9	5-Cyclopropyl-1-methyl-3-pyrazolyl	100-101
	157 A1-10	4-Chlor-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	210-212
	158 A1-9	4-Chlor-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	194-195
	159 A2-4	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	199
50	160 A1-22	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	175-177
	161 A1-18	4-Brom-1,5-dimethyl-3-pyrazolyl	155-157

55

Nr.	A	B	Fp (°C)
162	A1-1	1,4,5-Trimethyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	>220
163	A1-30	1,4,5-Trimethyl-3-pyrazolyl	148-150
5 164	A1-1	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	154-156
165	A1-1	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	90- 92
166	A1-2	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	137-139
167	A1-2	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	157-159
10 168	A1-9	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	167-169
169	A1-9	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	130-132
170	A1-10	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	116-118
171	A2-4	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	121-123
15 172	A1-29	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	128-130
173	A1-29	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	141-143
174	A1-27	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	>220
175	A1-30	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	96- 98
20 176	A1-30	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	>220
177	A1-22	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	93- 95
178	A1-22	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	82- 84
179	A1-28	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl	150-152
25 180	A1-28	4,5-Diethyl-1-methyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	120-122
181	A1-9	1-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	177-178
182	A1-10	1-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	180-181
183	A1-29	1-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	210
30 184	A1-30	1-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	167-168
185	A1-27	1-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	161-162
186	A1-28	1-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzopyrazol-3-yl	125-126
187	A1-1	1-Ethyl-5-methyl-3-pyrazolyl, Na-Salz	168-170
35 188	A1-2	1-Ethyl-5-methyl-3-pyrazolyl	90- 92
189	A1-30	1-Ethyl-5-methyl-3-pyrazolyl	120-121
190	A1-28	1-Ethyl-5-methyl-3-pyrazolyl	133-135
191	A1-1	1-Methyl-3-phenyl-4-pyrazolyl	32- 34
40 192	A1-30	1-Methyl-5-phenyl-4-pyrazolyl	199-201

Analog können darüber hinaus weitere Verbindungen hergestellt werden mit der allgemeinen Struktur



45

50

wobei

A für einen Rest aus der Gruppe E1 bis E97

B für einen Rest aus der Gruppe G1 bis G12

X für O, S oder NR<sup>3</sup>

55

W für O oder S

R<sup>3</sup> für einen Rest aus der Gruppe L1 bis L140R<sup>3</sup> für einen Rest aus der Gruppe V1 bis V35 beispielsweise stehen können und die Reste E, G, L, V, W und X beliebig kombiniert werden können,

oder wobei

A für einen Rest aus der Gruppe E1 bis E97

B für einen Rest aus der Gruppe G13 bis G14

X für O oder S

5 W für O oder S

R<sup>8</sup> für einen Rest aus der Gruppe L1 bis L 140 beispielsweise stehen können und die Reste E, G, L, W und X beliebig kombiniert werden können,

oder wobei

A für einen Rest aus der Gruppe E1 bis E97

10 B für den Rest G15

X für N

W für O oder S

R<sup>10</sup> für einen Rest aus der Gruppe Y1 bis Y16

15 R<sup>11</sup> für einen Rest aus der Gruppe Z1 bis Z13 beispielsweise stehen können und die Reste E, G, W, Y und Z beliebig kombiniert werden können.

A, B, R<sup>8</sup>, R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup> und R<sup>11</sup> können beispielsweise die folgenden Reste bedeuten:

20

25

30

35

40

45

50

55



Verb.		Verb.	
Nr.	A	Nr.	A
5	E1 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E36 2, 4, 6-Cl <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>2</sub>	
	E2 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E37 2-Br-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E3 2-CO <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E38 2, 6-Br <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	
	E4 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -6-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E39 2-CN-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
10	E5 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -6-OCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E40 2-OCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E6 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -6-CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E41 2-OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E7 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -3-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E42 2-OCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E8 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -3-F-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E43 2-OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
15	E9 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -6-F-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E44 2-OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E10 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -4-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E45 2-OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	
	E11 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -5-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E46 2-OCF <sub>3</sub>	
	E12 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -5-F-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E47 2-OCF <sub>2</sub> H-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
20	E13 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -5-OCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E48 2-OCH <sub>3</sub> -5-Br-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	
	E14 2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -5-OCHF <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E49 2, 5-(OCH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	
	E15 2-CON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E50 2, 5-(OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	
	E16 2-CON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -3-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E51 2-SCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
25	E17 2-CON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -3-F-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E52 2-SCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E18 2-CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E53 2-SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E19 2-CH <sub>2</sub> Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E54 2-SO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E20 2-CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E55 2-SO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
30	E21 2-CH <sub>2</sub> SCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E56 2-SO <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E22 2-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E57 2-SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E23 2-CH <sub>3</sub> -5-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E58 2-OSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E24 2, 5-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E59 2-OSO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
35	E25 2-CH <sub>3</sub> -5-OCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E60 2-COCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E26 2-F-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E61 2-C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	
	E27 2, 6-F <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E62 Pyrid-2-yl	
	E28 2-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	E63 3-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -pyrid-2-yl	
40	E29 2, 6-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E64 3-CO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -pyrid-2-yl	
	E30 2-Cl-6-CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E65 3-CON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -pyrid-2-yl	
	E31 2-Cl-6-OCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E66 3-Cl-pyrid-2-yl	
	E32 2-Cl-5-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E67 3-CF <sub>3</sub> -pyrid-2-yl	
45	E33 2, 5-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E68 3-OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -pyrid-2-yl	
	E34 2, 3-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>	E69 3-SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -pyrid-2-yl	
	E35 2, 5, 6-Cl <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>2</sub>	E70 3-SO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -pyrid-2-yl	

50

55

Verb.

Nr. A



5	E71	3-SOCH <sub>3</sub> -pyrid-2-yl
	E72	3-SOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> -pyrid-2-yl
	E73	3-SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -pyrid-2-yl
	E74	3-SO <sub>2</sub> NHCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -pyrid-2-yl
10	E75	Pyrid-3-yl
	E76	2-CON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -pyrid-3-yl
	E77	Thien-2-yl
	E78	3-Cl-thien-2-yl
15	E79	4-Cl-thien-2-yl
	E80	5-Cl-thien-2-yl
	E81	3-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -thien-2-yl
	E82	2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -thien-3-yl
20	E83	2-CON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -thien-3-yl
	E84	4-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -thien-3-yl
	E85	Naphth-1-yl
	E86	2-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -naphth-1-yl
25	E87	2-Cl-naphth-1-yl
	E88	8-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -naphth-1-yl
	E89	8-Cl-naphth-1-yl
	E90	8-OCH <sub>3</sub> -naphth-1-yl
30	E91	8-OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> -naphth-1-yl
	E92	8-OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl-naphth-1-yl
	E93	Naphth-2-yl
	E94	1-CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> -naphth-2-yl
35	E95	1-Cl-naphth-2-yl
	E96	1-OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> -naphth-2-yl
	E97	1-OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl-naphth-2-yl

40

45

50

55



Verb.		Verb.	
Nr.	R8	Nr.	R8
5	L1 H	L36	cyclo-C <sub>5</sub> H <sub>9</sub>
	L2 F	L37	cyclo-C <sub>6</sub> H <sub>11</sub>
	L3 Cl	L38	Tetrahydropyran-2-yl
	L4 Br	L39	Tetrahydropyran-3-yl
10	L5 J	L40	Tetrahydrofuran-2-yl
	L6 CN	L41	Tetrahydrofuran-3-yl
	L7 NO <sub>2</sub>	L42	Thien-2-yl
	L8 CH <sub>3</sub>	L43	Thien-3-yl
15	L9 C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	L44	Furan-2-yl
	L10 n-C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	L45	Furan-3-yl
	L11 i-C <sub>3</sub> H <sub>7</sub>	L46	1-Methylpyrazol-3-yl
	L12 n-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	L47	1-Methylpyrazol-4-yl
20	L13 i-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	L48	1-Methylpyrazol-5-yl
	L14 s-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	L49	1-Ethylpyrazol-3-yl
	L15 tert.-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>	L50	1-Ethylpyrazol-4-yl
	L16 CH <sub>2</sub> F	L51	1-Ethylpyrazol-5-yl
25	L17 CH <sub>2</sub> Cl	L52	OCH <sub>3</sub>
	L18 CH <sub>2</sub> Br	L53	OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	L19 CHF <sub>2</sub>	L54	OCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
	L20 CF <sub>3</sub>	L55	OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl
30	L21 CCl <sub>3</sub>	L56	OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>
	L22 CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> F	L57	OCF <sub>3</sub>
	L23 CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> Cl	L58	OCF <sub>2</sub>
	L24 CH <sub>2</sub> -CHF <sub>2</sub>	L59	OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
35	L25 CH <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub>	L60	OC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	L26 CH <sub>2</sub> -CCl <sub>3</sub>	L61	OCH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	L27 CF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub>	L62	SC <sub>3</sub> H <sub>7</sub>
	L28 CH <sub>2</sub> -O-CH <sub>3</sub>	L63	SC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
40	L29 CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -OCH <sub>3</sub>	L64	SC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	L30 CH(CH <sub>3</sub> )OCH <sub>3</sub>	L65	SC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	L31 CH(CH <sub>3</sub> )CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	L66	CH <sub>2</sub> -CH=CH <sub>2</sub>
	L32 CH <sub>2</sub> OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	L67	CH(CH <sub>3</sub> )-CH=CH <sub>2</sub>
45	L33 CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	L68	CH <sub>2</sub> -C(CH <sub>3</sub> )=CH <sub>2</sub>
	L34 cyclo-C <sub>3</sub> H <sub>5</sub>	L69	CH <sub>2</sub> -CH=CH-CH <sub>3</sub>
	L35 cyclo-C <sub>4</sub> H <sub>7</sub>	L70	CH <sub>2</sub> -C=CH

50

55

	Verb.		Verb.	
	Nr.	R <sup>8</sup>	Nr.	R <sup>8</sup>
5	L71	CH(CH <sub>3</sub> ) - C=CH	L106	CO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	L72	CH <sub>2</sub> -C=C-CH <sub>3</sub>	L107	CONH <sub>2</sub>
	L73	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	L108	CONHCH <sub>3</sub>
10	L74	2-CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L109	CON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
	L75	3-CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L110	CONHC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	L76	4-CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L111	CON(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>
	L77	2-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L112	CONHCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
	L78	3-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L113	CONHCH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
15	L79	4-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L114	CONHC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	L80	2-F-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L115	CONHOCH <sub>3</sub>
	L81	3-F-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L116	CONHOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	L82	4-F-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L117	SO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
20	L83	2-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L118	SO <sub>2</sub> NCH <sub>3</sub> (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> )
	L84	3-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L119	SO <sub>2</sub> N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>
	L85	4-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L120	SO <sub>2</sub> NHCH <sub>3</sub>
	L86	2-NO <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L121	SO <sub>2</sub> NHC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
25	L87	3-NO <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L122	SO <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>
	L88	4-NO <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L123	SO <sub>2</sub> OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	L89	2-CH <sub>3</sub> O-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L124	SO <sub>2</sub> OCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
	L90	3-CH <sub>3</sub> O-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L125	SO <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl
30	L91	4-CH <sub>3</sub> O-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	L126	SO <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
	L92	COCH <sub>3</sub>	L127	OSO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
	L93	COCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	L128	OSO <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	L94	CO(cycloC <sub>3</sub> H <sub>5</sub> )	L129	OSO <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
35	L95	COCH <sub>2</sub> Cl	L130	OSO <sub>2</sub> N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
	L96	COCH <sub>2</sub> Br	L131	SOCH <sub>3</sub>
	L97	COCH <sub>2</sub> F	L132	SOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	L98	COCF <sub>3</sub>	L133	SOCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
40	L99	COCH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	L134	SOC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	L100	CO <sub>2</sub> H	L135	SO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
	L101	CO <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	L136	SO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
	L102	CO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	L137	SO <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
45	L103	CO <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	L138	SO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
	L104	CO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	L139	zwei vicinale Reste R <sup>8</sup> bilden gemeinsam eine C <sub>3</sub> -Methylenkette
	L105	CO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	L140	zwei vicinale Reste R <sup>8</sup> bilden gemeinsam eine C <sub>4</sub> -Methylenkette
50				

EP 0 482 349 A2

	Verb.	
	Nr.	R <sup>9</sup>
5	v1	H
	v2	CH <sub>3</sub>
	v3	CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
	v4	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> F
10	v5	CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
	v6	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl
	v7	CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>
	v8	CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
15	v9	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
	v10	cyclo-C <sub>3</sub> H <sub>5</sub>
	v11	cyclo-C <sub>4</sub> H <sub>7</sub>
	v12	cyclo-C <sub>5</sub> H <sub>9</sub>
20	v13	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	v14	2-CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
	v15	2-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
	v16	2,6-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
25	v17	2,6-(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	v18	2-CH <sub>3</sub> -6-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	v19	2-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
	v20	2,4-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
30	v21	2,6-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	v22	2,4,6-Cl <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>2</sub>
	v23	2,6-Cl <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>2</sub>
	v24	2-Cl-4-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
35	v25	CH <sub>2</sub> -CH=CH <sub>2</sub>
	v26	CH=CH <sub>2</sub>
	v27	CH <sub>2</sub> -C≡CH
	v28	CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
40	v29	COCH <sub>3</sub>
	v30	COC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	v31	COC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	v32	CH <sub>2</sub> F
45	v33	CHF <sub>2</sub>
	v34	CF <sub>3</sub>
	v35	CF <sub>2</sub> Cl

50

55

	Verb.	
	Nr.	R10
5	Y1	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	Y2	2-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
	Y3	2-F-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
	Y4	2-CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
10	Y5	2-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	Y6	2-OCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	Y7	2,3-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	Y8	2,4-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
15	Y9	2,5-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	Y10	2,6-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	Y11	2,4,6-Cl <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>2</sub>
	Y12	CH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
20	Y13	OC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	Y14	OCH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
	Y15	SC <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
25	Y16	SCH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>

	Verb.	
	Nr.	R11
	Z1	H
	Z2	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
35	Z3	2-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
	Z4	2-F-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
	Z5	2-CH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
	Z6	2-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
40	Z7	2-OCH <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>4</sub>
	Z8	2,4-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	Z9	2,6-Cl <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	Z10	2,6-F <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
45	Z11	2,6-(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	Z12	2-Cl-4-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
	Z13	2,6-Cl <sub>2</sub> -4-CF <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> H <sub>2</sub>

50

Anwendungsbeispiele

A Herbizide Wirkung

55

Die herbizide Wirkung der Sulfonylharnstoffe der Formel I ließ sich durch Gewächshausversuche zeigen:

Als Kulturgefäße dienten Plastikblumentöpfe mit lehmigem Sand mit etwa 3,0 % Humus als Substrat. Die Samen der Testpflanzen wurden nach Arten getrennt eingesät.

Bei Voraufaufbehandlung wurden die in Wasser suspendierten oder emulgierten Wirkstoffe direkt nach Einsaat mittels fein verteilter Düsen aufgebracht. Die Gefäße wurden leicht beregnet, um Keimung und Wachstum zu fördern und anschließend mit durchsichtigen Plastikhauben abgedeckt, bis die Pflanzen angewachsen waren. Diese Abdeckung bewirkt ein gleichmäßiges Keimen der Testpflanzen, sofern dies nicht durch die Wirkstoffe beeinträchtigt wurde. Die Aufwandmengen betrugen 0,125 kg/ha a.S.

Zum Zwecke der Nachaufaufbehandlung wurden die Testpflanzen je nach Wuchshöhe erst bei einer Wuchshöhe von 3 bis 15 cm mit den in Wasser suspendierten oder emulgierten Wirkstoffen behandelt. Die Aufwandmenge für die Nachaufaufbehandlung betrug 0,25 kg/ha a.S..

Die Pflanzen wurden artenspezifisch bei Temperaturen von 10-25°C bzw. 20-35°C gehalten. Die Versuchsperiode erstreckte sich über 2 bis 4 Wochen. Während dieser Zeit wurden die Pflanzen gepflegt und ihre Reaktion auf die einzelnen Behandlungen wurde ausgewertet.

Bewertet wurde nach einer Skala von 0 bis 100. Dabei bedeutet 100 kein Aufgang der Pflanzen bzw. völlige Zerstörung zumindest der oberirdischen Teile und 0 keine Schädigung oder normaler Wachstumsverlauf.

Die in den Gewächshausversuchen verwendeten Pflanzen setzten sich aus folgenden Arten zusammen:

Lateinischer Name	Deutscher Name
Abutilon theophr.	Chinesischer Hanf
Chenopodium album	Weißer Gänsefuß
Triticum aestivum	Sommerweizen

Mit 0,25 kg/ha a.S. im Nachaufaufverfahren eingesetzt, lassen sich mit dem Beispiel 40 breitblättrige unerwünschte Pflanzen sehr gut bekämpfen, bei gleichzeitiger Verträglichkeit an der Beispielkultur Weizen.

#### B Wachstumsregulierende Wirkung

Zur Bestimmung der wachstumsregulierenden Eigenschaft der Prüfsbstanzen wurden Testpflanzen auf ausreichend mit Nährstoffen versorgtem Kultursubstrat in Kunststoffgefäßen von ca. 12,5 cm Durchmesser angezogen.

Im Nachaufaufverfahren wurden die zu prüfenden Substanzen in wäßriger Aufbereitung auf die Pflanzen gesprüht. Die beobachtete wachstumsregulierende Wirkung wurde bei Versuchsende durch Wuchshöhenmessung belegt. Die so gewonnenen Meßwerte wurden zur Wuchshöhe der unbehandelten Pflanzen in Relation gesetzt. Als Vergleichssubstanz A diente 2-Chlorethyltrimethylammoniumchlorid.

Gleichlaufend zur Reduzierung des Längenwachstums stieg die Farbintensität der Blätter an. Der erhöhte Chlorophyllgehalt läßt eine ebenfalls erhöhte Photosyntheserate und damit eine erhöhte Ertragsbildung erwarten.

Die Einzeldaten sind den folgenden Tabellen B-1 und B-2 zu entnehmen.

Tabelle B-1

Sommerweizen, "Ralle", Nachaufauf-Blattbehandlung		
Nr.d.chem. Beispiele	Konzentration mg a.S./Gefäß	Wuchshöhen rel.
unbehandelt	-	100
A	1,5	82,2
40	1,5	73,1



Tabelle B-2

Sommergerste, "Aramir"; Nachauflauf-Blattbehandlung		
Nr.d.chem. Beispiele	Konzentration mg a.S./Gefäß	Wuchshöhen rel.
unbehandelt	-	100
A	1,5	90,7
40	1,5	69,4

## Patentansprüche

## 1. Sulfonamide der allgemeinen Formel I



in der die Substituenten folgende Bedeutung haben:

A



(A1)



(A2)



(A3)



(A4)



(A5)



(A6)



(A7)



(A8)



(A9)



(A10)

W  
Sauerstoff, Schwefel;

B

2-, 3-, 4- oder 5-Furyl, 2-, 3-, 4- oder 5-Thienyl, jeweils substituiert durch drei Reste R<sup>8</sup>;

2-, 3-, 4- oder 5-Pyrrolyl, wobei diese genannten Reste drei C-gebundene Reste R<sup>8</sup> und einen N-gebundenen Rest R<sup>9</sup> tragen;

2-, 4- oder 5-Oxazolyl, 3-, 4- oder 5-isoxazolyl, 2-, 4- oder 5-Thiazolyl, 3-, 4- oder 5-Isotiazolyl, jeweils substituiert durch zwei Reste R<sup>8</sup>;

2-, 4- oder 5-Imidazoly, 3-, 4- oder 5-Pyrazoly, wobei diese genannten Reste zwei C-gebundene Reste R<sup>8</sup> und einen N-gebundenen Rest R<sup>9</sup> tragen;

1,3,4-Thiadiazol-2-yl, -5-yl, 1,3,4-Oxadiazol-2-yl, -5-yl,  
1,2,4-Thiadiazol-3-yl, -5-yl, 1,2,4-Oxadiazol-3-yl, -5-yl,  
1,2,3-Thiadiazol-4-yl, -5-yl, 1,2,3-Oxadiazol-4-yl, -5-yl,  
1,2,5-Thiadiazol-3-yl, -4-yl, 1,2,5-Oxadiazol-3-yl, -4-yl,  
wobei diese Reste einen Rest R<sup>8</sup> tragen;

1,2,4-Triazol-3-yl, substituiert durch einen C-gebundenen Rest R<sup>10</sup> und einen N-1 gebundenen Rest R<sup>11</sup>;

1,2,4-Triazol-5-yl, 1,2,3-Triazol-4-yl, -5-yl, jeweils substituiert durch einen C-gebundenen Rest R<sup>8</sup> und einen N-1 gebundenen Rest R<sup>9</sup>;

X Sauerstoff, Schwefel, NR<sup>1</sup>;

R<sup>1</sup>  
Wasserstoff;

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, gegebenenfalls substituiert durch ein bis fünf Halogenatome und/oder Phenyl;

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl;

Phenyl, das gegebenenfalls ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Substituenten tragen kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Nitro, Cyano;

R<sup>2</sup>  
Halogen;  
Cyano; Thiocyano;

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, welches durch ein bis fünf Halogenatome und/oder einen der folgenden Reste substituiert sein kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy oder Phenylthio, wobei die Phenylreste jeweils durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkoxy, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenylthio, wobei diese cyclischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

Phenyl, Phenoxy, Benzoyloxy oder Benzylthio, wobei die aromatischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

gesättigter, einfach oder zweifach ungesättigter 5-7-gliedriger Heterocyclus, enthaltend ein bis zwei Stickstoff-, Sauerstoff- und/oder Schwefelatome, welcher gegebenenfalls bis zu zwei der folgenden Substituenten tragen kann: Halogen, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkoxy oder C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylthio,

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyloxy oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenylthio,

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylloxy oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylthio,

wobei die genannten Alkoxy-, Alkylthio-, Alkenyl-, Alkyl-, Alkenylloxy(thio)-, Alkylloxy(thio)reste durch ein bis fünf Halogenatome und/oder eine der folgenden Gruppen substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio, Benzylloxy, Benzylthio;

CO<sup>R</sup><sup>12</sup>; COQR<sup>13</sup>; SO<sub>2</sub>NR<sup>15</sup>R<sup>16</sup>; SO<sub>2</sub>OR<sup>17</sup>; OSO<sub>2</sub>R<sup>18</sup>; S(O)<sub>n</sub>R<sup>19</sup>;

R<sup>3</sup>  
einen der Reste R<sup>6</sup>; COQR<sup>13</sup>; SO<sub>2</sub>NR<sup>15</sup>R<sup>16</sup>; SO<sub>2</sub>OR<sup>17</sup>; OSO<sub>2</sub>R<sup>18</sup>; S(O)<sub>n</sub>R<sup>19</sup>;

R<sup>4</sup>  
Wasserstoff; Halogen; Cyano;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl substituiert durch ein bis fünf Halogenatome; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>5</sup>  
Wasserstoff; Nitro oder einen der Reste R<sup>2</sup>;

R<sup>6</sup>  
Wasserstoff; Halogen; Cyano;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl substituiert durch ein bis fünf Halogenatome und/oder einen der folgenden Reste: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, OH, SH, Cyano;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, wobei die genannten Alkoxy(thio)- bzw. Halogenalkoxy(thio)reste durch folgende Gruppen substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>7</sup>  
Nitro; oder einen der Reste R<sup>2</sup>;

R<sup>8</sup>  
Wasserstoff; Nitro;

einen der Reste R<sup>2</sup>, oder zwei vicinale Reste R<sup>2</sup> bilden gemeinsam eine C<sub>3</sub>-Kette oder eine C<sub>4</sub>-C<sub>6</sub>-Kette, in der eine Methylen- oder eine Sauerstoff- oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyliminoeinheit ersetzt sein kann;

R<sup>9</sup>  
Wasserstoff;

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, welches durch ein bis fünf Halogenatome und/oder einen der folgenden Reste substituiert sein kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio-, wobei diese cyclischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cyclobalkenyl, wobei diese cyclischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

Phenyl, wobei dieser Rest durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein kann: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkynyl, wobei die genannten Reste durch ein bis gegebenenfalls fünf Halogenatome und/oder eine der folgenden Gruppen substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio, Benzyloxy, Benzylthio;

COR<sup>21</sup>;

R<sup>10</sup>

Phenyl, Benzyl, Phenoxy, Benzyloxy, Phenylthio, Benzylthio, wobei die genannten Reste durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Gruppen substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>11</sup>

Wasserstoff; Phenyl, Benzyl, wobei die genannten aromatischen Reste durch 1 bis 5 Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Gruppen substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>12</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, unsubstituiert oder substituiert durch Halogen oder Methoxy; C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, unsubstituiert oder substituiert durch Chlor oder Fluor; C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl;

Q

Sauerstoff oder NR<sup>14</sup>;

R<sup>13</sup>

Wasserstoff;

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, substituiert durch ein bis drei der folgenden Reste: Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-alkoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl und/oder Phenyl;

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, substituiert durch ein bis drei C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylgruppen;

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl; C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkynyl;

Phenyl, Phenyl substituiert durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Gruppen: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>14</sup>

OR<sup>20</sup>, ein Rest R<sup>13</sup> oder gemeinsam mit einem weiteren Rest R<sup>13</sup> eine C<sub>4</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylkette, in der eine Methyleneinheit durch einen Sauerstoff oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyliminogruppe ersetzt sein kann;

R<sup>15</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkynyl; Cyclopropylmethyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Cycloalkyl;

R<sup>16</sup>

Wasserstoff; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl; oder gemeinsam mit R<sup>15</sup> eine C<sub>4</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylkette, in der eine Methyleneinheit durch einen Sauerstoff ersetzt sein kann;

R<sup>17</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl;

R<sup>18</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; N,N-Dimethylamino;

R<sup>19</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl; C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxyalkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkynyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl; Phenyl; Phenyl, substituiert durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl oder Methoxy;

n  
1 oder 2;

5 R<sup>20</sup>  
Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl;

R<sup>21</sup>  
10 ein Rest R<sup>12</sup>; Phenyl, Benzyl, wobei diese aromatischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome  
und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-  
Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

sowie deren umweltverträglichen Salze.

15 2. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 oder deren umweltverträglichen Salze, worin  
A einen Rest der Formel (A1), (A2), (A7), (A8), (A9),  
W Sauerstoff  
X Schwefel  
B 2-, 4- oder 5-Oxazolyl, 3-, 4- oder 5-Isoxazolyl, 2-, 4- oder 5-Thiazolyl, 3-, 4- oder 5-  
20 Isothiazolyl, wobei diese genannten Reste zwei Reste R<sup>8</sup> tragen;  
2-, 4- oder 5-Imidazolyl, 3-, 4- oder 5-Pyrazolyl, wobei diese genannten Reste zwei C-  
gebundene Reste R<sup>8</sup> und einen N-gebundenen Rest R<sup>3</sup> tragen;  
R<sup>4</sup> Wasserstoff  
25 bedeuten.

3. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 2 oder deren umweltverträglichen Salze, worin  
A einen Rest der Formel (A1) und  
B 3-, 4- oder 5-Pyrazolyl, substituiert durch zwei C-gebundene Reste R<sup>8</sup> und einen N-gebunde-  
nen Rest R<sup>3</sup>, bedeuten.

4. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit W = O oder deren Salze gemäß Anspruch  
1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel II




mit einer Verbindung der Formel III




in der Hal Chlor oder Brom bedeutet, in Gegenwart einer Base in einem inerten Lösungsmittel in an  
sich bekannter Weise umsetzt.

5. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit W = O oder deren Salze gemäß Anspruch  
1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Carbonsäure der Formel IV



in Anwesenheit von aktivierenden Reagentien, wie 2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid, Dicyclohexylcarbo-  
nildimid oder 1,1-Carbonyldimidazol und gegebenenfalls in Gegenwart einer Base mit einer Verbindung  
der Formel II gemäß Anspruch 4 in an sich bekannter Weise umsetzt.

6. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit  $W = O$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel V



mit einer Verbindung der Formel VI



wobei M Wasserstoff oder Lithium bedeutet, umsetzt.

7. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit  $W = O$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel VII



in Gegenwart einer starken Base mit einem Säureamid der Formel VIII



in an sich bekannter Weise umsetzt.

8. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit  $W = O$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel IX



worin T ein Alkalimetall bedeutet, mit einer Verbindung der Formel X




worin Hal für Chlor oder Brom steht, und einem Aldehyd der Formel XI



in an sich bekannter Weise umsetzt.

9. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I mit  $W = S$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel I mit  $W = O$  mit der Verbindung der Formel XII



in an sich bekannter Weise umsetzt.

10. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I mit  $W = O$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel XIII



5 in der der Heterocyclus B' einen C-gebundenen Substituenten trägt, der als Abgangsgruppe fungiert, mit einem Nucleophil in an sich bekannter Weise umgesetzt.

11. Herbizides Mittel, enthaltend ein Sulfonamid der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 oder dessen Salz sowie übliche inerte Zusatzstoffe.

12. Mittel zur Beeinflussung des Pflanzenwuchses, enthaltend ein Sulfonamid der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 oder dessen Salz sowie übliche inerte Zusatzstoffe.

13. Verfahren zur Bekämpfung unerwünschten Pflanzenwuchses, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Sulfonamid der Formel I, gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 oder dessen Salz auf die Pflanzen und/oder deren Lebensraum einwirken läßt.

14. Verfahren zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Sulfonamid der Formel I, gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 oder dessen Salz auf die Pflanzen und/oder deren Lebensraum einwirken läßt.


Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat : ES

1. Herbizides Mittel, enthaltend neben üblichen inerten Zusatzstoffen Sulfonamide der allgemeinen Formel I



in der die Substituenten folgende Bedeutung haben:

A



W  
Sauerstoff, Schwefel;

B  
2-, 3-, 4- oder 5-Furyl, 2-, 3-, 4- oder 5-Thienyl, jeweils substituiert durch drei Reste R<sup>8</sup>;

2-, 3-, 4- oder 5-Pyrrolyl, wobei diese genannten Reste drei C-gebundene Reste R<sup>8</sup> und einen N-gebundenen Rest R<sup>9</sup> tragen;

2-, 4- oder 5-Oxazolyl, 3-, 4- oder 5-Isoxazolyl, 2-, 4- oder 5-Thiazolyl, 3-, 4- oder 5-Isotiazolyl, jeweils substituiert durch zwei Reste R<sup>8</sup>;

2-, 4- oder 5-Imidazolyl, 3-, 4- oder 5-Pyrazolyl, wobei diese genannten Reste zwei C-gebundene Reste R<sup>8</sup> und einen N-gebundenen Rest R<sup>9</sup> tragen;

1,3,4-Thiadiazol-2-yl, -5-yl, 1,3,4-Oxadiazol-2-yl, -5-yl,  
1,2,4-Thiadiazol-3-yl, -5-yl, 1,2,4-Oxadiazol-3-yl, -5-yl,  
1,2,3-Thiadiazol-4-yl, -5-yl, 1,2,3-Oxadiazol-4-yl, -5-yl,  
1,2,5-Thiadiazol-3-yl, -4-yl, 1,2,5-Oxadiazol-3-yl, -4-yl,  
wobei diese Reste einen Rest R<sup>8</sup> tragen;

1,2,4-Triazol-3-yl, substituiert durch einen C-gebundenen Rest R<sup>10</sup> und einen N-1 gebundenen Rest R<sup>11</sup>;

1,2,4-Triazol-5-yl, 1,2,3-Triazol-4-yl, -5-yl, jeweils substituiert durch einen C-gebundenen Rest R<sup>8</sup> und einen N-1 gebundenen Rest R<sup>9</sup>;

X Sauerstoff, Schwefel, NR<sup>1</sup>;

R<sup>1</sup>  
Wasserstoff;

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, gegebenenfalls substituiert durch ein bis fünf Halogenatome und/oder Phenyl;

C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl;



Phenyl, das gegebenenfalls ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Substituenten tragen kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Nitro, Cyano;

R<sup>2</sup>

Halogen;

Cyano; Thiocyano;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, welches durch ein bis fünf Halogenatome und/oder einen der folgenden Reste substituiert sein kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy oder Phenylthio, wobei die Phenylreste jeweils durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkylthio, C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenylthio, wobei diese cyclischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

Phenyl, Phenoxy, Benzyloxy oder Benzylthio, wobei die aromatischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

gesättigter, einfach oder zweifach ungesättigter 5-7-gliedriger Heterocyclus, enthaltend ein bis zwei Stickstoff-, Sauerstoff- und/oder Schwefelatome, welcher gegebenenfalls bis zu zwei der folgenden Substituenten tragen kann: Halogen, Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio,

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyloxy oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenylthio,

C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylthio oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylthio,

wobei die genannten Alkoxy-, Alkylthio-, Alkenyl-, Alkyl-, Alkenyloxy(thio)-, Alkylthio(thio)reste durch ein bis fünf Halogenatome und/oder eine der folgenden Gruppen substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio, Benzyloxy, Benzylthio;

CO<sup>12</sup>; COQR<sup>13</sup>; SO<sub>2</sub>NR<sup>15</sup>R<sup>16</sup>; SO<sub>2</sub>OR<sup>17</sup>; OSO<sub>2</sub>R<sup>18</sup>; S(O)<sub>n</sub>R<sup>19</sup>;

R<sup>3</sup>

einen der Reste R<sup>6</sup>; COQR<sup>13</sup>; SO<sub>2</sub>NR<sup>15</sup>R<sup>16</sup>; SO<sub>2</sub>OR<sup>17</sup>; OSO<sub>2</sub>R<sup>18</sup>; S(O)<sub>n</sub>R<sup>19</sup>;

R<sup>4</sup>

Wasserstoff; Halogen; Cyano;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl substituiert durch ein bis fünf Halogenatome; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>5</sup>

Wasserstoff; Nitro oder einen der Reste R<sup>2</sup>;

R<sup>6</sup>

Wasserstoff; Halogen; Cyano;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl substituiert durch ein bis fünf Halogenatome und/oder einen der folgenden Reste: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, OH, SH, Cyano;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, wobei die genannten Alkoxy(thio)- bzw. Halogenalkoxy(thio)reste durch folgende Gruppen substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>7</sup>

Nitro; oder einen der Reste R<sup>2</sup>;

R<sup>8</sup>

Wasserstoff; Nitro;

einen der Reste R<sup>2</sup>, oder zwei vicinale Reste R<sup>2</sup> bilden gemeinsam eine C<sub>3</sub>-Kette oder eine C<sub>4</sub>-C<sub>5</sub>-Kette, in der eine Methyleneneinheit durch einen Sauerstoff oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyliminoeinheit ersetzt sein kann;

R<sup>9</sup>

Wasserstoff;

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, welches durch ein bis fünf Halogenatome und/oder einen der folgenden Reste substituiert sein kann: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio-, wobei diese cyclischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: Cyano, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Cycloalkenyl, wobei diese cyclischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

Phenyl, wobei dieser Rest durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein kann: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkynyl, wobei die genannten Reste durch ein bis gegebenenfalls fünf Halogenatome und/oder eine der folgenden Gruppen substituiert sein können: C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio, Benzyloxy, Benzylthio;

COR<sup>21</sup>;

R<sup>10</sup>

Phenyl, Benzyl, Phenoxy, Benzyloxy, Phenylthio, Benzylthio, wobei die genannten Reste durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Gruppen substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>11</sup>

Wasserstoff; Phenyl, Benzyl, wobei die genannten aromatischen Reste durch 1 bis 5 Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Gruppen substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>12</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, unsubstituiert oder substituiert durch Halogen oder Methoxy; C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Cycloalkyl, unsubstituiert oder substituiert durch Chlor oder Fluor; C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl;

Q

Sauerstoff oder NR<sup>14</sup>;

R<sup>13</sup>

Wasserstoff;

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, substituiert durch ein bis drei der folgenden Reste: Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy-C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub>-alkoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl und/oder Phenyl;

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, substituiert durch ein bis drei C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylgruppen;

C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl; C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl;

Phenyl, Phenyl substituiert durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Gruppen: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

R<sup>14</sup>

OR<sup>20</sup>; ein Rest R<sup>13</sup> oder gemeinsam mit einem weiteren Rest R<sup>15</sup> eine C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylenkette, in der eine Methyleninheit durch einen Sauerstoff oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyliminogruppe ersetzt sein kann;

R<sup>15</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; Cyclopropylmethyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Cycloalkyl;

R<sup>16</sup>

Wasserstoff; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl; oder gemeinsam mit R<sup>15</sup> eine C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylenkette, in der eine Methylenengruppe durch einen Sauerstoff ersetzt sein kann;

R<sup>17</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl;

R<sup>18</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; N,N-Dimethylamino;

R<sup>19</sup>

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl; C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxyalkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl; C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl; Phenyl; Phenyl, substituiert durch Fluor, Chlor, Brom, Methyl oder Methoxy;

n

1 oder 2;

R<sup>20</sup>

Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl;

R<sup>21</sup>

ein Rest R<sup>12</sup>; Phenyl, Benzyl, wobei diese aromatischen Gruppen durch ein bis fünf Halogenatome und/oder ein bis drei der folgenden Reste substituiert sein können: Cyano, Nitro, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkoxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Halogenalkylthio;

sowie deren umweltverträglichen Salze.

2. Herbizides Mittel gemäß Anspruch 1, enthaltend Sulfonamide der Formel I gemäß Anspruch 1 oder deren umweltverträglichen Salze, worin

A einen Rest der Formel (A1), (A2), (A7), (A8), (A9),

W Sauerstoff

X Schwefel

B 2-, 4- oder 5-Oxazolyl, 3-, 4- oder 5-Isoxazolyl, 2-, 4- oder 5-Thiazolyl, 3-, 4- oder 5-Isotiazolyl, wobei diese genannten Reste zwei Reste R<sup>6</sup> tragen;

2-, 4- oder 5-Imidazolyl, 3-, 4- oder 5-Pyrazolyl, wobei diese genannten Reste zwei C-

gebundene Reste  $R^6$  und einen N-gebundenen Rest  $R^9$  tragen;  
 $R^4$  Wasserstoff  
 bedeuten.

3. Herbizides Mittel gemäß Anspruch 1, enthaltend Sulfonamide der Formel I gemäß Anspruch 2 oder deren umweltverträglichen Salze, worin  
 A einen Rest der Formel (A1) und  
 B 3-, 4- oder 5-Pyrazolyl, substituiert durch zwei C-gebundene Reste  $R^6$  und einen N-gebundenen Rest  $R^9$ , bedeuten.

4. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit  $W = O$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel II



mit einer Verbindung der Formel III




in der Hal Chlor oder Brom bedeutet, in Gegenwart einer Base in einem inerten Lösungsmittel in an sich bekannter Weise umsetzt.

5. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit  $W = O$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Carbonsäure der Formel IV



in Anwesenheit von aktivierenden Reagentien, wie 2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid, Dicyclohexylcarbodiimid oder 1,1-Carbonyldiimidazol und gegebenenfalls in Gegenwart einer Base mit einer Verbindung der Formel II gemäß Anspruch 4 in an sich bekannter Weise umsetzt.

6. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit  $W = O$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel V



mit einer Verbindung der Formel VI




wobei M Wasserstoff oder Lithium bedeutet, umsetzt.

7. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit  $W = O$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel VII



in Gegenwart einer starken Base mit einem Säureamid der Formel VIII



in an sich bekannter Weise umgesetzt.


- 10 8. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I mit  $\text{W} = \text{O}$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel IX



- 15 worin T ein Alkalimetall bedeutet, mit einer Verbindung der Formel X




worin Hal für Chlor oder Brom steht, und einem Aldehyd der Formel XI




in an sich bekannter Weise umgesetzt.

- 25 9. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I mit  $\text{W} = \text{S}$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel I mit  $\text{W} = \text{O}$  mit der Verbindung der Formel XII



- 35 in an sich bekannter Weise umgesetzt.

10. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I mit  $\text{W} = \text{O}$  oder deren Salze gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel XIII



- 45 in der der Heterocyclus B' einen C-gebundenen Substituenten trägt, der als Abgangsgruppe fungiert, mit einem Nucleophil in an sich bekannter Weise umgesetzt.

11. Mittel zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums, enthaltend ein Sulfonamid der Formel I gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 oder dessen Salz sowie übliche inerte Zusatzstoffe.

- 50 12. Verfahren zur Bekämpfung unerwünschten Pflanzenwachstums, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Sulfonamid der Formel I, gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 oder dessen Salz auf die Pflanzen und/oder deren Lebensraum einwirken läßt.

- 55 13. Verfahren zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Sulfonamid der Formel I, gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 oder dessen Salz auf die Pflanzen und/oder deren Lebensraum einwirken läßt.



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 482 349 A3**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 91115834.3

Int. Cl.5 **C07D 231/14, C07D 231/16,  
C07D 231/56, C07D 233/90,  
C07D 263/34, C07D 277/34,  
C07D 307/68, C07D 333/38,  
C07D 409/12, A01N 43/50,  
A01N 43/76**

22 Anmeldetag: 18.09.91

20 Priorität: 20.09.90 DE 4029753

23 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
29.04.92 Patentblatt 92/18

24 Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL**

26 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 06.05.92 Patentblatt 92/19

27 Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
**Carl-Bosch-Strasse 38**  
**W-6700 Ludwigshafen(DE)**

28 Erfinder: **Heistracher, Elisabeth, Dr.**  
**Lenbachstrasse 10**  
**W-6700 Ludwigshafen(DE)**  
Erfinder: **Fischer, Klaus, Dr.**  
**Gabelsbergerstrasse 7**  
**W-6720 Speyer(DE)**  
Erfinder: **Mayer, Horst, Dr.**  
**Faselwiese 19**

**W-6700 Ludwigshafen(DE)**  
Erfinder: **Saupe, Thomas, Dr.**  
**Kressenwiesenweg 13**  
**W-6902 Sandhausen(DE)**  
Erfinder: **Hamprecht, Gerhard, Dr.**  
**Rote-Turm-Strasse 28**  
**W-6940 Weinheim(DE)**  
Erfinder: **Ditrich, Klaus, Dr.**  
**Paray-le-Monial-Strasse 12**  
**W-6702 Bad Duerkheim(DE)**  
Erfinder: **Kuekenhoechner, Thomas, Dr.**  
**Forststrasse 104**  
**W-6737 Boehl-Iggelheim(DE)**  
Erfinder: **Gerber, Matthias, Dr.**  
**Ritterstrasse 3**  
**W-6704 Mutterstadt(DE)**  
Erfinder: **Walter, Helmut, Dr.**  
**Gruenstadter Strasse 82**  
**W-6719 Obrigheim(DE)**  
Erfinder: **Westphalen, Karl-Otto, Dr.**  
**Mausbergweg 58**  
**W-6720 Speyer(DE)**

29 Sulfonamide.

27 Die Abfassung der Ansprüche ist nicht klar und knapp zu fassen (Art. 83-84. EPA) und enthält eine so grosse Zahl Verbindungen dass eine vollständige Recherche auf ökonomischer Gründe nicht möglich ist (siehe Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil B, Kapitel III, 2.(Umfang der Recherche)).

Die Recherche beschränkt sich deshalb ausschliesslich auf diejenigen Endprodukte die durch physikalische oder chemische Daten charakterisiert sind d.h. die Beispielsubstanzen.

EP 0 482 349 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT Nummer der Anmeldung

der nach Regel 45 des Europäischen Patent-  
übereinkommens für das weitere Verfahren als  
europäischer Recherchenbericht gilt

EP 91 11 5834

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kenzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	DE-A-1 670 945 (BAYER AG) ---		C 07 D 231/14 C 07 D 231/16 C 07 D 231/56 C 07 D 233/90 C 07 D 263/34 C 07 D 277/34 C 07 D 307/68 C 07 D 333/38 C 07 D 409/12 A 01 N 43/50 A 01 N 43/76
A	ARZNEIMITTEL FORSCHUNG, vol. 24, no. 3a, March 1974, pages 363-374, Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie, Aulendorf, DE; H. PLÜMPE et al.: "Isoxazolcarboxamidoalkylbenzolsulfonyl-harnstoffe, -semicarbazide und -aminopyrimidine sowie damit verwandte Verbindungen und ihre blutzuckersenkende Wirkung" ---		
A	CHEMISCHE BERICHTE, vol. 106, no. 4, April 1973, pages 1290-1302; G. SIEWERT et al.: "Hydroxylierung von 5-Alkyl-2-(benzolsulfonylamino)pyrimidin en und strukturverwandten Antidiabetika" ---		
D,A	EP-A-O 269 141 (DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V.) ---	-/-	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)  C 07 D A 01 N
UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE			
<p>Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung den Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens so wenig, daß es nicht möglich ist, auf der Grundlage einiger Patentansprüche sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen.</p> <p>Vollständig recherchierte Patentansprüche: Unvollständig recherchierte Patentansprüche: Nicht recherchierte Patentansprüche: Grund für die Beschränkung der Recherche:</p> <p>siehe Blatt -C-</p>			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 17-12-1991	Prober DE BUYSER I.A.F.
KATEGORIE DER GENANNEN DOKUMENTEN			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einem anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund P : nichtschriftliche Offenbarung Q : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das (jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EP 91 11 5834 (1991)

